



Accepted Manuscript

Accepted Manuscript (Uncorrected Proof)

Title: Neurofeedback Intervention and Athletic Performance Optimization; Systematically review, metaanalysis and proposing a theoretical model

Authors: Amin Amini*¹, Mohammad Vaezmousavi²

1. Assistant Professor, Department of Knowledge and Cognitive Intelligence ,Imam Hossein University.
(Corresponding Author)
2. Full Professor, Department of Knowledge and Cognitive Intelligence ,Imam Hossein University.

***Corresponding:** Amin Amini , Assistant Professor, Department of Knowledge and Cognitive Intelligence , Imam Hossein University.

amini.a@ut.ac.ir

To appear in: Sport Psychology Studies

Receive Date: 05 August 2021

Revise Date: 22 November 2021

Accept Date: 30 November 2021

First Publish Date: 01 December 2021

This is a “Just Accepted” manuscript, which has been examined by the peer-review process and has been accepted for publication. A “Just Accepted” manuscript is published online shortly after its acceptance, which is prior to technical editing and formatting and author proofing. Journal of Sport Psychology Studies provides “Just Accepted” as an optional service which allows authors to make their results available to the research community as soon as possible after acceptance. After a manuscript has been technically edited and formatted, it will be removed from the “Just Accepted” Website and published as a published article. Please note that technical editing may introduce minor changes to the manuscript text and/or graphics which may affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain.

Please cite this article as:

Amini, A., VaezMousavi, M. Neurofeedback Intervention and Athletic Performance Optimization; Systematically review, metaanalysis and proposing a theoretical model. Sport Psychology Studies, 2021; (); -. doi: 10.22089/spsyj.2021.11070.2214

نسخه پذیرفته شده پیش از انتشار

عنوان: اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران: مرور نظام‌دار، فرا تحلیل و

پیشنهاد یک الگوی نظری

نویسندگان: امین امینی^{1*}، سید محمد کاظم واعظ موسوی²

1. استادیار پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) (نویسنده و مسئول)
2. استاد پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

*نویسنده مسئول: امین امینی، استادیار پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع).

ایمیل: amini.a@ut.ac.ir

نشریه: مطالعات روان‌شناسی ورزشی

تاریخ دریافت: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری: ۰۱ آذر ۱۴۰۰

تاریخ پذیرش: ۰۹ آذر ۱۴۰۰

تاریخ اولین انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰

این نسخه «پذیرفته شده پیش از انتشار» مقاله است که پس از طی فرآیند داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت کوتاهی پس از اعلام پذیرش به صورت آنلاین و قبل از فرآیند ویراستاری منتشر می‌شود. نشریه مطالعات روان‌شناسی ورزشی گزینه «پذیرفته شده پیش از انتشار» را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می‌دهد تا نتایج آنها در سریع‌ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه مقاله‌ای فرآیند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می‌کند، از نسخه «پذیرفته شده پیش از انتشار» خارج و در یک شماره مشخص در وبسایت نشریه منتشر می‌شود. شایان ذکر است صفحه آرای و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می‌شود که ممکن است بر محتوای آن تاثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

لطفا این گونه استناد شود:

Amini, A., VaezMousavi, M. Neurofeedback Intervention and Athletic Performance Optimization; Systematically review, metaanalysis and proposing a theoretical model. Sport Psychology Studies, 2021; (); -. doi: 10.22089/spsyj.2021.11070.2214

Abstract

Many reports show that neurofeedback intervention affects the performance of athletes. However, neurofeedback intervention has wide dimensions and has different effects depending on the type of protocol, how to intervene, and the target community. The meta-analysis method determines the effect size of the intervention method by integrating the results of different researches. By doing a meta-analysis, a more general view of the effect of the intervention can be obtained. Therefore, the present study was conducted to achieve the effect of neurofeedback intervention on athletes' performance and investigate other factors affecting its effectiveness, and propose a theoretical model. The present study is a systematic review and a meta-analysis. In the first phase of the study, all studies which are published in English or Farsi, on the effectiveness of neurofeedback intervention on athletes' performance were systematically reviewed. Among them, studies with meta-analysis criteria were reviewed by Meta-Analysis basics and applications. Out of 758 studies, 28 studies had a meta-analyze design. In the second stage, a specific intervention model for athletes was developed based on various components affecting performance. The results showed the effect size (ES) of Neurofeedback Intervention is large according to Cohen's table. Therefore, neurofeedback intervention improves the performance of athletes. In the second stage, the factors affecting the performance of athletes following neurofeedback intervention were developed in the form of a specific intervention model for athletes. The findings of this meta-analysis showed a "large" ES for neurofeedback intervention on Athletic Performance Optimization. This can confirm the opinion of researchers about the importance of neurofeedback intervention in optimizing the performance of athletes.

Keywords: Cognitive Readiness; Excellent Brain Functions; Functions of the Mind; Performance Optimization;

چکیده

گزارش‌های بسیاری نشان می‌دهند مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران تأثیرگذار است. باین‌حال، مداخله نوروفیدبک ابعاد گسترده‌ای دارد و با توجه به نوع پروتکل، چگونگی مداخله و جامعه هدف اثرات متفاوتی می‌گذارد. روش فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف، اندازه اثر روش مداخله را مشخص می‌کند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف دستیابی به اندازه اثر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران و بررسی سایر عوامل مؤثر در اثربخشی آن و پیشنهاد یک الگوی نظری انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه مروری از نوع فراتحلیل می‌باشد. در مرحله اول پژوهش، تمامی پژوهش‌های فارسی و انگلیسی انجام‌شده در زمینه اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران به طور نظام‌مند مرور شدند و از میان آن‌ها، پژوهش‌های دارای ملاک‌های فراتحلیل، توسط نرم‌افزار جامع فراتحلیل بررسی شدند. از میان ۷۵۸ مطالعه به دست آمده، تعداد ۲۸ مطالعه فراتحلیل شدند. در مرحله دوم، یک الگوی مداخله‌ای ویژه ورزشکاران بر اساس مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر عملکرد، تدوین شد. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخله نوروفیدبک طبق جدول کوهن زیاد است؛ لذا مداخله نوروفیدبک عملکرد ورزشکاران را بهتر می‌کند. در مرحله دوم، عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد ورزشکاران به دنبال مداخله نوروفیدبک، در قالب یک الگوی مداخله‌ای ویژه ورزشکاران تدوین شد. به‌طور کلی از یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران زیاد است و می‌تواند نظر محققین مبنی بر اهمیت مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران را تأیید نمود.

واژه‌گان کلیدی: آمادگی شناختی؛ کارکردهای عالی مغز؛ کارکردهای ذهن؛ بهینه‌سازی عملکرد؛

مقدمه

یکی از اهداف بلندمدت محققان علوم ورزشی در جهت بهینه‌سازی و ارتقاء عملکرد ورزشکاران، تمرکز بر توانمندسازی و افزایش کارایی شناختی ورزشکاران است. تغییرات محیط، تجهیزات، فنون و روش‌های تمرینی ورزشکاران و همچنین رقابتی شدن بخش علم و فناوری در حوزه‌های ورزشی و افزایش کارآمدی نهادهای پژوهشی و آموزشی از جمله آزمایشگاه‌های نوروساینس ورزشی، دلیلی بر این مدعاست. لذا آنچه برای باشگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت و در رقابت‌های ورزشی موفقیت را به همراه می‌آورد، افزایش کارآمدی ورزشکاران است. براین اساس لازم است تا با بهره‌گیری از دانش‌های میان‌رشته‌ای به‌ویژه علوم و فناوری‌های شناختی گام‌های تازه‌ای در راستای بهینه‌سازی و ارتقاء عملکرد ورزشکاران برداشته شود. در همین راستا، کیل^۱ (۱۹۶۸) نظریه کنترل حرکتی^۲ را برای توضیح عملکرد ورزشی ارائه داد. این نظریه به این موضوع اشاره دارد که دستیابی به بهترین سطح عملکرد، به توانایی برنامه‌ریزی دقیق حرکات در انتهای مرحله آمادگی^۳ برای اجرا وابسته است.

فرضیه کارایی روانی-حرکتی^۴ در حوره فیزیولوژی عصبی^۵ نیز دیدگاه ویژه‌ای برای درک بیشتر فرایند پردازش قشر مغز^۶ در جهت بهبود عملکرد ورزشی فراهم می‌کند (هافلر، اسپالدینگ، سانتاماریا و هاتفیلد^۷، ۲۰۰۰). فرضیه کارایی روانی-حرکتی بیان می‌کند که سرکوب فرایندهای نامرتب با تکلیف و تقویت فرایندهای مربوط به تکلیف با پردازش ادراکی-حرکتی^۸ بهتری در زمینه عملکرد ورزشی مرتبط است (هاتفیلد، هافلر، هانگ و اسپالدینگ^۹، ۲۰۰۴). در همین رابطه اخیراً پژوهش‌هایی در رابطه با بررسی اثربخشی مداخله نوروفیدبک^{۱۰} بر عملکرد ورزشکاران اجرا شده و از

الکتروانسفالوگرافی^{۱۱} برای بررسی فعالیت قشر مغز طی فرایند آماده‌سازی برای اجرا و در حین اجرای حرکت استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، چنگ و همکاران^{۱۲} (۲۰۱۷) دریافتند که بهترین عملکرد تیراندازی قبل از اجرای شلیک، در بالاترین طول موج ریتم حسی حرکتی^{۱۳} بود، در حالی که قبل از شروع ضعیف‌ترین عملکرد، شاهد کاهش قدرت ریتم حسی حرکتی بودند. همچنین، کاهش فعالیت قشر مغز یا به‌طور دقیق‌تر کاهش میزان فعال شدن مناطق نیمکره چپ مغز هنگام برنامه‌ریزی و اجرای حرکات در ورزشکاران خبره، در مقایسه با ورزشکاران تازه‌کار در بسیاری از مطالعات مشاهده شده است (هانگ، هافلر، لوو، مایرکرس و هاتفیلد^{۱۴}، ۲۰۰۸). علاوه بر این، پژوهش‌های نشان دادند که پس از یک دوره طولانی آموزش مهارت ورزشی به ورزشکاران تازه‌کار، که به تدریج باعث افزایش مهارت‌های حرکتی آن‌ها می‌شود، سطح فعال‌سازی نیمکره چپ مغز آن‌ها کاهش می‌یابد (برآد^{۱۵} و همکاران، ۱۹۸۴). این نتایج نه تنها با بیان اینکه رابطه نزدیکی بین قشر مغز و اوج عملکرد ورزشی وجود دارد و از فرضیه کارایی روانی-حرکتی پشتیبانی می‌کند، بلکه محققان را به استفاده از آموزش نوروفیدبک در جهت بهبود عملکرد ورزشکاران ترغیب می‌کند.

مداخله نوروفیدبک یک روش بازخورد بیولوژیکی^{۱۶} است که برای آموزش ورزشکاران در تنظیم الگوی فعال‌سازی قشر مغزی استفاده می‌شود (نریمانی، رجبی و دلاور، ۲۰۱۳). در الگوی معمولی مداخله نوروفیدبک، سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی مورد نظر از قشر مغز ورزشکاران به طور مداوم اندازه‌گیری شده و در زمان مشخص به شکل بازخورد بینایی یا شنیداری به آنان ارائه می‌شود. با گذشت زمان، ورزشکاران می‌توانند یاد بگیرند که حالت خاص ذهن / مغز آن‌ها با سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی چگونه ارتباط پیدا می‌کند و به این ترتیب امکان کنترل اختیاری قشر مغز برای

1. Keele
2. Theory of Motor Control
3. Preparation
4. Psychomotor Efficiency Hypothesis
5. Neurophysiological
6. Cortical Processing
7. Hauffer, Spalding, Santa Maria, & Hatfield
8. Perceptual-Motor
9. Hatfield, Hauffer, Hung, & Spalding
10. Neurofeedback Intervention

11. Electroencephalography (EEG)
12. Cheng et al.
13. Sensorimotor Rhythm (SMR)
14. Hung, Hauffer, Lo, Mayer-Kress, & Hatfield
15. Brad
16. Biological Feedback

و همکاران، ۲۰۱۴)، با این حال، اخیراً، شواهدی مشاهده شده است که نشان می‌دهد مداخله نوروفیدبک ممکن است عملکرد و رفتارهای شناختی را در هر دو جمعیت بالینی و سالم بهبود بخشد (روگالا^{۱۲} و همکاران، ۲۰۱۶)، این موضوع محققان را به سمت انجام پژوهش‌هایی در خصوص اجرای مداخله نوروفیدبک در جامعه سالم به‌ویژه ورزشکاران سوق داده است. علاوه بر این، مداخله نوروفیدبک می‌تواند تغییرات الکتروانسفالوگرافی ورزشکاران را هنگام اجرای یک سری تکالیف حرکتی، که فرض می‌شود روش‌های مستقیم خود تنظیمی را ارائه می‌دهند، ثبت کند. بنابراین، محققان به دنبال آن هستند تا از مداخله نوروفیدبک به عنوان ابزاری موثر برای بهبود عملکرد ورزشی استفاده کنند (میریفر، بکمن و ارلنسیپل^{۱۳}، ۲۰۱۷).

اولین مطالعه در این خصوص توسط لندرز و همکاران^{۱۴} (۱۹۹۱) اجرا شد که از پتانسیل‌های قشری مداخله نوروفیدبک برای بررسی عملکرد ورزشی کمانداران خبره در سه گروه استفاده کردند. دو گروه از شرکت‌کنندگان مداخله نوروفیدبک دریافت کردند، در حالی که گروه سوم به عنوان گروه کنترل فعالیت نداشت. گروه مداخله یک نوروفیدبک تشویق می‌شد که سطح فعالیت قشر خود را در ناحیه T3 به سمت منفی بیشتر (بازخورد صحیح^{۱۵}) افزایش دهد. گروه مداخله دو نوروفیدبک تشویق می‌شد تا سطح فعالیت قشر خود را در ناحیه T4 به سمت منفی بیشتر (بازخورد نادرست^{۱۶}) تغییر دهند. مداخله نوروفیدبک این محققان بر اساس درک عمیق از فرضیه کارایی روانی-حرکتی طراحی شده بود. پتانسیل قشر آهسته^{۱۷} نشان دهنده تغییر منفی الکتروانسفالوگرافی پایه در چند ثانیه قبل از اجرای یک رویداد ارادی است و فرض بر این است که آماده‌سازی یا بسیج منابع مغزی را برای یک پاسخ پیش‌بینی شده نشان می‌دهد

تنظیم شناخت، احساسات و رفتار فراهم می‌شود. به عبارت دیگر نوروفیدبک بر یک رابط مغز و کامپیوتر^۱ مبتنی است و توسط یک سیستم نرم‌افزاری و یک خط لوله پردازش، در مجموع از پنج عنصر تشکیل شده است (سوانگ‌بریک، برنسد، هولتمن و کورتس^۲، ۲۰۱۴). نوروفیدبک فعالیت مغز ورزشکاران را که از قبل پردازش شده است، اندازه‌گیری می‌کند. پارامترهای از پیش انتخاب شده مغز (باند فرکانس خاص یا پتانسیل مغزی) به صورت آنلاین محاسبه می‌شوند و به سیگنال‌هایی ترجمه می‌شوند که در زمان واقعی به کاربر برگردانده می‌شوند؛ بنابراین، ویژگی‌های منتخب فعالیت مغز برای ورزشکاران قابل درک است. از طریق این بازخورد، ورزشکاران می‌توانند یاد بگیرند که فعالیت مغز خود را تنظیم کنند تا مستقیماً مکانیسم عصبی زیربنایی شناخت و رفتار را تغییر دهند (ضیاء بخش، شریفی، فتح‌آبادی و نجاتی، ۲۰۲۰). بیان شده است که نوروفیدبک مبتنی بر اصول یادگیری مهارت‌های رویه‌ای^۳ است. با توجه به این مکانیسم‌های یادگیری، انتظار می‌رود که در طول آموزش نوروفیدبک، نوروپلاستیسیته^۴ یا انعطاف‌پذیری هومواستاتیک^۵ انجام شود. اعتقاد بر این است که چنین مکانیسم‌هایی مانع از فعالیت‌های شدید مغز مانند تغییر پاتولوژیک می‌شوند (ضیاء بخش و همکاران، ۲۰۲۰).

هرچند مداخله نوروفیدبک در اصل در برخی از مطالعات بالینی برای درمان اختلالات روانشناختی^۶، مانند اضطراب^۷، افسردگی^۸، اختلال استرس پس از سانحه^۹ و اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه^{۱۰} طراحی شده است (میکولاندفرانچی^{۱۱}

1. Brain-Computer Interface (BCI)

2. Sonuga-Barke, Brandeis, Holtmann, & Cortese

3. Procedural Skills

۴. در علوم اعصاب، انعطاف‌پذیری سیناپس‌ها یا پلاستیسیته سیناپسی (Synaptic

Plasticity) توانایی سیناپس‌ها برای تقویت یا تضعیف در طی زمان، در پاسخ به افزایش یا کاهش فعالیتشان است

۵. در علوم اعصاب، انعطاف‌پذیری هومواستاتیک (Homeostatic Plasticity) اشاره دارد به ظرفیت نورون برای تنظیم تحرک پذیری خود نسبت به فعالیت شبکه، یک تنظیم جبرانی که در مقیاس زمانی اتفاق می‌افتد.

6. Psychological Disorders

7. Anxiety

8. Depression

9. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

10. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

11. Micoulaud-Franchi

12. Rogala

13. Mirifar, Beckmann, & Ehrlenspiel

14. Landers, et al.

15. Correct Feedback

16. Incorrect Feedback

17. Slow Cortical Potentials (SCPS)

ادراک و تجربه اندازه‌گیری شود. به عبارت دیگر، معیار روش اثربخشی مداخله نوروفیدبک این است که هر دو متغیر تغییرات الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی به طور خاص در زمینه ورزش مورد ارزیابی قرار گیرند (اورندورف-پلانکت و همکاران، ۲۰۱۷). با این حال، در طول پژوهش‌های فعلی در مورد اثربخشی مداخله نوروفیدبک، بسیاری از مطالعات فقط بهبود عملکرد ورزشی را بدون شناسایی تغییرات الکتروانسفالوگرافی از پیش‌آزمون به پس‌آزمون، که فاقد معیارهای ضروری بررسی عملکرد است، گزارش کرده‌اند. اگر مداخله نوروفیدبک نتواند تغییرات مورد انتظار را در سطح الکتروانسفالوگرافی ایجاد کند، طرح مطالعه ایده‌آل لازم را ندارد و بنابراین، بهبود عملکرد را نمی‌توان به سادگی متأثر از مداخله نوروفیدبک دانست. برای رفع این مشکل و ارزیابی بهتر کارایی مداخله نوروفیدبک، لازم است تا هر دو تغییر در قدرت الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی تحلیل شوند. موضوع دیگری که باید در نظر گرفته شود، مسائل مربوط به طراحی و استفاده از گروه کنترل است. برخی از مطالعات مداخله نوروفیدبک از یک گروه کنترل غیرفعال استفاده کردند که هیچ‌گونه مداخله آموزشی دریافت نکردند (میکیسین^۶ و همکاران، ۲۰۱۵). این طرح مطالعه نمی‌تواند طراحی ایده‌آلی باشد، زیرا نمی‌توان بهبود عملکرد ورزشی را کاملاً به خود تمرین نسبت داد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها ممکن است تحت تأثیر اثر دارونما باشد. در راستای این مسائل، در این فرا تحلیل، ما بر اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران متمرکز شده‌ایم.

این حقیقت که کاربرد پروتکل‌های نوپدید و متعدد نوروفیدبک (تعداد جلسات، ناحیه هدفمند مغز، پارامتر انتخاب شده مغز، مکانیسم اجرا) و «استانداردهای توافق شده» مناسب و آموزش‌های اولیه برای ورزشکاران دارای گوناگونی زیادی است که موجبات سردرگمی آنان را فراهم می‌آورد، بر لزوم انجام فراتحلیل اثربخشی مداخله‌ها تاکید می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر با کاربرد روش فرا تحلیل در پی پاسخگویی به این سؤال است که اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی

(بیربومر، البرت، کانوان و روکستروچ^۱، ۱۹۹۰). همانطور که انتظار می‌رفت، نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که بهترین عملکرد تنها در گروه بازخورد صحیح مشاهده شد، در حالی که گروه بازخورد نادرست عملکرد نسبتاً ضعیف‌تری نشان دادند (سالازر^۲ و همکاران، ۱۹۹۰). لازم به ذکر است که لندرز و همکاران (۱۹۹۱) شرکت‌کنندگان را برای افزایش پتانسیل‌های قشری، نه تغییر دادن مؤلفه فرکانس خاصی از الکتروانسفالوگرافی (به عنوان مثال، باند فرکانس آلفا) آموزش دادند.

علاوه بر پژوهش قبل که شواهدی برای بررسی اثربخشی مداخله نوروفیدبک در تیراندازی با کمان ارائه دادند. مطالعات معاصر نیز باندهای فرکانسی خاصی را دست‌کاری می‌کنند، تا اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشی را مشاهده نمایند. با این وجود، مطالعاتی که با استفاده از طرح پژوهشی کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده^۳ اجرا شده باشند، هنوز محدود هستند و نتایج متناقضی از تأثیرات آموزشی نوروفیدبک ارائه داده‌اند. به عنوان مثال، چنگ و همکاران (۲۰۱۵) الف و ب) دریافت که تقویت ریتم حسی حرکتی به طور قابل توجهی عملکرد ورزشکاران گلف را بهبود می‌بخشد، در حالی که رینگ، کوک^۴ و همکاران (۲۰۱۵) دریافتند که تقویت فرکانس آلفا عملکرد ورزشکاران گلف را بهبود نمی‌بخشد. بدیهی است که لازم بود تا یک بررسی سیستماتیک و فراتحلیل در خصوص این نتایج ناسازگار انجام شود.

نکته مهم در اینجا این است که در هنگام بررسی اثربخشی مداخله نوروفیدبک، دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع اولی که باید در نظر گرفته شود این است که با توجه به اینکه ماهیت ارزیابی اثربخشی مداخله نوروفیدبک افزایش عملکرد ورزشی از طریق بررسی تغییرات الکتروانسفالوگرافی است (اورندورف-پلانکت، سینگ، آرگون و پیندا^۵، ۲۰۱۷)، بنابراین اثر مداخله نوروفیدبک باید در هر دو سطح تغییرات در فعالیت پایه قشر و نتایج آشکار رفتاری مانند، حرکت،

1. Birbaumer, Elbert, Canavan, & Rockstroh
2. Salazar
3. Randomized Controlled Trial
4. Cooke
5. Orndorff-Plunkett, Singh, Aragón, & Pineda

6. Mikicin

عملکرد ورزشکاران به چه میزان است.

روش‌شناسی پژوهش

نوع پژوهش

در این پژوهش از فراتحلیل مرکب جهت جمع‌آوری، ترکیب و خلاصه کردن یافته‌های پژوهشی مرتبط با تأثیر نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران استفاده شده است. در فراتحلیل، اصل اساسی محاسبه‌ی اندازه اثر برای پژوهش‌های مجزا و برگرداندن آن‌ها به یک ماتریس مشترک و آنگاه ترکیب آن‌ها برای دستیابی به میانگین تأثیر می‌باشد.

منابع داده

جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش در مرحله مرور نظام‌مند، تمامی مقالات مربوط به موضوع و نمایه شده در پایگاه‌های داده پاب‌مد^۱، گوگل اسکالر^۲، اسکاپوس^۳ پایگاه اطلاعاتی کوکران^۴، سای اینفو^۵، ساینس دایرکت^۶، مگ ایران^۷ (بانک اطلاعات نشریات کشور) و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی^۸ بود. همچنین محدوده زمانی در نظر گرفته شده برای جستجوی مقالات از تاریخ ۲۰۱۰/۰۹/۰۱ تا ۲۰۲۰/۰۹/۰۱ می‌باشد. کلیدواژه‌های استفاده شده شامل عبارت نوروفیدبک، همراه با ورزش، عملکرد ورزشی و ورزشکار بود. غربال منابع مقالات انتخاب شده و بررسی‌های مربوطه توسط دو نویسنده به صورت مستقل انجام شد.

معیار انتخاب و حذف مقالات

مطالعات در صورتی وارد پژوهش شدند که موضوع پژوهش مداخله نوروفیدبک در زمینه بهبود عملکرد ورزشکاران بود؛ همچنین دارای شرایط لازم از نظر روش‌شناسی (فرضیه‌سازی، روش پژوهش، جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، مفروضه‌های آماری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری) بوده و نتایج پژوهش از طریق سایت

های معتبر مورد بررسی در این پژوهش قابل دسترسی باشند. ملاک‌های خروج مقالات نیز شامل پژوهش‌هایی بود که به صورت خلاصه مقاله و یا به صورت مروری یا همبستگی انجام شده بودند، و مقالاتی که متن کامل آن‌ها وجود نداشت، و همچنین مقالاتی که بر اساس سیاهه ارزیابی نقادانه آزان (فارسی/انگلیسی)؛ تمام متن؛ هدف‌گیری متغیرهای شناختی؛ تناسب نوع مطالعه با اهداف؛ ورود صحیح موردها و کنترل؛ کنترل متغیرهای مخدوش گر نتایج (متغیر کنترل)؛ حجم نمونه کافی؛ روش نمونه‌گیری؛ پایایی و روایی ابزار؛ تناسب روش تحلیل با مطالعه؛ تعمیم‌پذیری [امتیاز صفر به دست آوردند (داشتن حداقل معیارها برای فرا تحلیل یک و نداشتن حداقل معیارها برای فرا تحلیل صفر تلقی می‌شد).

شیوه استخراج داده‌ها

با استفاده از چک‌لیست گزینش پژوهش، داده‌های هر مطالعه به طور مستقل استخراج شد. مشخصات ثبت شده از مطالعات شامل نام نویسنده اول، سال انتشار، حجم نمونه، سن شرکت‌کننده، پروتکل مداخله، مکان قراردادن الکترودها، مدت مداخله، نوع بازخورد، نوع کنترل، عملکرد ورزشی و سطح مهارت ورزشکاران بود. جهت فرا تحلیل از خلاصه نتایج، میانگین، انحراف معیار^۹ و تعداد شرکت‌کنندگان هر گروه قبل و بعد از مداخله استفاده شد.

شیوه تحلیل داده‌ها

داده‌ها، پس از استخراج (میانگین گروه‌های آزمایش و کنترل، انحراف معیار گروه‌ها و تعداد نمونه در هر گروه)، به وسیله نرم افزار جامع فراتحلیل^{۱۰} و با استفاده از روش فراتحلیل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که آزمون‌های آماری استفاده شده در فرضیات پس از تبدیل به اندازه اثر از طریق فرمول‌های ارائه شده توسط ولف^{۱۱} (۱۹۸۶)، با ترکیب اندازه‌های اثر به روش اشمیت و هانتز^{۱۲} (۲۰۱۵) مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن^{۱۳} استفاده شد (کوهن، ۱۹۸۸).

9. Standard Deviation (SD)

10. Meta- Analysis Basics and Applications (CMA2)

11. Wolf

12. Schmidt and Hunter

13. Cohen

1. PubMed

2. Google Scholar

3. Scopus

4. Cochrane database

5. PsycInfo

6. Science Direct

7. Magiran

8. Scientific Information Database (SID)

۲۰۱۹). علاوه بر بررسی ناهمگنی در فراتحلیل، لازم است سوگیری انتشار نیز بررسی شود. بنابراین، ابتدا سوگیری انتشار با استفاده از نمودار کیفی^۵ بررسی شد و سپس برای رفع ناهمگنی و سوگیری انتشار احتمالی، اندازه‌های اثر پرت یا افراطی از طریق تحلیل حساسیت^۶ شناسایی و حذف شدند. در نهایت برای پاسخ‌گویی به سؤال‌های پژوهش، ابتدا اندازه اثر ترکیبی مطالعات اولیه به تفکیک ابزارها و معیارهای عملکرد ورزشی مورد استفاده، نوع ورزش براساس تیمی یا انفرادی بودن و سطح مهارت ورزشکاران محاسبه شد. در نهایت جهت آزمون هم‌زمان انگاره اثربخشی مفروض‌ها، روش الگویابی معادلات ساختاری^۷ اعمال گردید.

یافته‌ها

نتایج جستجو

بر اساس مرور نظام‌مند که از پیش‌نیازهای فرا تحلیل است، مطالعات بر اساس یک الگوی ارزیابی دقیق (سیاهه ارزیابی مقالات) مورد بررسی قرار گرفت و مقالات مناسب شناسایی و وارد مرور فرا تحلیل شد. در شکل ۱، ابتدا روند جستجو و جمع‌آوری منابع پرداخته شده است که عبارت است از ۷۵۸ مقاله شناسایی شده در منابع جستجو، حذف موارد تکراری برابر ۱۷۸، نتایج غربال‌گری اولیه برابر ۱۷۶، حذف مقالات با بررسی عنوان و چکیده و فقدان تمام متن برابر ۷۸، انتخاب موارد جهت بررسی متن اصلی برابر ۱۹۸، حذف مقالات بر اساس بررسی متن اصلی برابر ۱۵۰، مقالات نهایی جهت بررسی مروری برابر ۴۶، حذف مقالات بر اساس بررسی نتایج پژوهش برابر ۱۸ و سپس فرا تحلیل مقالات نهایی جهت فرا تحلیل برابر ۲۸ بود. در ادامه، مقالات مرتبط با مداخله نوروفیدبک و اندازه اثر مطالعات بیان شده است.

پس از محاسبه اندازه اثر معمولاً محقق دچار تردید می‌شود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یا نه؟ به‌زعم اندیشمندان، بهترین معیار برای تفسیر و قضاوت در مورد مقدار اندازه اثر، چه از طریق شاخص I^2 و چه از طریق شاخص d محاسبه شده باشد، باید از مرور پیشینه تحقیق به دست آید؛ یعنی باید مقادیر اندازه اثر تحقیقاتی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه کرد و میانگین آن‌ها را به‌عنوان معیار مناسب برای مقایسه سایر اندازه‌های اثر که در آینده در آن حوزه تحقیقاتی انجام می‌شود انتخاب نمود. البته کوهن معیارهایی را برای استفاده سریع پیشنهاد می‌کند که در جدول ۱ آمده است (قاضی طباطبایی، و دادهیر، ۱۳۸۹).

جدول ۱- حدود بالا و پایین اندازه اثر

Table 1- Upper and lower limits of effect size

حد بالای اندازه اثر	حد پایین اندازه اثر	
۰/۳	۰/۱	کوچک
۰/۵	۰/۳	متوسط
۰/۸	۰/۵	بزرگ

بنابر ماهیت مطالعات اولیه وارد شده به این فراتحلیل (مطالعات مربوط به تفاوت‌های گروهی) برای محاسبه اندازه اثر از شاخص D^1 استفاده شد (لاکنس^۲، ۲۰۱۳). مراحل کار به این صورت بود که ابتدا از روش محاسبه اندازه اثر تفکیکی برای هر مطالعه، اندازه اثر خلاصه با مدل اثرات تصادفی^۳ برای مجموع مطالعات و آزمون‌های تشخیص ناهمگنی استفاده شد. آزمون Q کوکران برای تشخیص معناداری ناهمگنی و شاخص مجذور I برای تعیین میزان ناهمگنی موجود مورد استفاده قرار گرفت. شاخص مجذور I برای تعیین ناهمگنی در فراتحلیل مناسب است زیرا مقدار ناهمگنی را بدون تأثیر پذیری از حجم نمونه نشان می‌دهد (جین، شارما و جین^۴،

5. Funnel Chart

6. Sensitivity Analysis


7. Structural Equation Modelin (SEM)

1. Effect size indices D

2. Lakens

3. Random Effects Model

4. Jain, Sharma, & Jain



شکل ۱- روند جستجو و جمع‌آوری منابع جهت فراتحلیل

Figure 1 - The process of searching and gathering resources for meta-analysis

شده‌اند. حجم نمونه پژوهش‌ها از ۷ تا ۶۰ نفر و در مجموع ۱۱۸۶ نفر با میانگین ۲۵/۷۸ نفر بود. میانگین سنی شرکت‌کنندگان نیز ۲۲/۶۲ سال بود. نسبت جنسیت

ویژگی‌های مطالعات مشخصات اصلی ۴۶ مطالعه بررسی شده در جدول ۲ خلاصه شده است. این مطالعات بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ منتشر

بودند.

نتایج مرور نظام‌مند

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مقالات منتشرشده توسط محققین در زمینه تأثیر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران، ۴۶ مقاله بود. در جدول ذیل خلاصه نتایج حاصل از مرور نظام‌مند مقالات منتشرشده ارائه شده است.

شرکت‌کنندگان ۱۵/۲۲٪ زن و ۳۹/۱۳٪ مرد و ۴۵/۶۵٪ مرد و زن بودند و رشته ورزشی شرکت‌کنندگان شامل گلف، تنیس روی میز، تیر و کمان، تیراندازی، دارت، بسکتبال، دوومیدانی، ژیمناستیک، شنا، فوتبال، و ورزش‌های رزمی بود. شرکت‌کنندگان، ورزشکاران در تمام سطح مهارت‌ها، از مبتدی (۳۴/۷۸٪)؛ نیمه خبره (۳۴/۷۸٪) تا خبره (۳۰/۴۴٪) بودند. تعداد جلسات مداخله‌ای از ۱ تا ۲۰ جلسه با میانگین ۱۴/۴۱ جلسه و مدت زمان جلسات ۲۰ تا ۷۵ دقیقه با میانگین ۲۸/۴۳ دقیقه در هر جلسه بود. نوع بازخورد نوروفیدبک ارائه شده شامل ۸/۶۹٪ بازخورد دیداری؛ ۱۵/۲۱٪ بازخورد شنیداری؛ ۷۶/۱۰٪ بازخورد دیداری-شنیداری بود. مکان الکترودها نیز شامل نقاط C3 / C4 / Cz / Oz / P3 / P4 / Pz / T3 / T4 / O1 / F3 / F4 / Fz / FCz بود. پروتکل نوروفیدبک ارائه شده تقویت ریتم حسی حرکتی و بتا و سرکوب تتا و بتا ۲، تقویت ریتم حسی حرکتی سرکوب تتا و بتا - تقویت بتا و سرکوب بتا، تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب آلفا، تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب بتا، تقویت تتا و سرکوب آلفا در ناحیه Pz، تقویت آلفا و تتا، تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و های‌بتا، تقویت بتا و سرکوب آلفا، تقویت بتا و سرکوب تتا، تقویت تتا و سرکوب آلفا، تقویت دلتا، تتا و آلفا و سرکوب بتا، بتا ۱ بتا ۲ و گاما، تقویت تتا، سرکوب آلفا و تتا و تقویت ریتم حسی حرکتی، سرکوب تتا، سرکوب موج آلفا، سرکوب آلفا و تقویت تتا بود. شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران شامل انعطاف‌پذیری شناختی، حداکثر اکسیژن مصرفی^۱، استرس، اضطراب، افسردگی، برنامه‌ریزی، پردازش بصری، تعادل، تغییرات ضربان قلب، تغییرات الکتروانسفالوگرافی (ریتم حسی حرکتی (۱۲-۱۵ هرتز)، آلفا (۸-۱۲ هرتز)، تتا (۴-۸ هرتز) و پتانسیل قشر آهسته (۵-۲۰ هرتز))، توجه، حافظه، خلاقیت، دقت عملکرد، سرعت پردازش، زمان واکنش، کنترل حرکت، کیفیت خواب، و کنترل ترس بود. هرچند ۸۹/۱۳٪ از مطالعات از گروه کنترل در پژوهش خود استفاده نمودند، با این وجود تنها ۳ مطالعه از یک گروه کنترل فعال / دارونما مانند بازخورد نادرست استفاده کرده

1. VO2 max

جدول ۲- مشخصات مقالات منتشر شده توسط محققین در زمینه مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران

Table 2 - Specifications of articles published by researchers in the field of neurofeedback intervention on performance optimization of athletes

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع بازخورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
میکیچین و همکاران	۲۰۲۰	C3 / C4	دیداری	تقویت بتا	۲۰	۲۰	بدون گروه کنترل	۷	۲۱/۵	زن	عملکرد ذهنی و پارامترهای فیزیولوژیکی	نیمه خبره	شنا
گونگ ^۱ و همکاران	۲۰۲۰	C3 / Cz / C4 / T3 / T4	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب آلفا	۶	۴۵	با گروه کنترل	۴۵	۱۹/۵	مرد	تغییرات الکتروانسفالوگرافی استراحت	خبره	تیراندازی
سیدهو ^۲ و همکاران	۲۰۲۰	Cz	دیداری و شنیداری	تقویت آلفا و سرکوب آلفا	۲	۳۰	با گروه کنترل	۲۵	۲۳/۵	مرد و زن	کارکرد ادراکی - حرکتی	مبتدی	همگانی
ماسکزیک ^۳ و همکاران	۲۰۲۰	C3	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و سرکوب تتا	۱۵	۱۰	با گروه کنترل	۱۲	۲۳/۵	مرد	پردازش بصری و زمان واکنش	خبره	جودو
جیونت ^۴ و همکاران	۲۰۲۰	C3 / C4 / Cz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی	۱۰	۲۵	بدون گروه	۸	۲۱/۴	مرد و زن	عملکرد دروازه بان فوتبال	خبره	فوتبال

1. Gong
2. Sidhu
3. Maszczyk
4. Jeunet

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع باز خورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
وانگ ^۱ و همکاران	۲۰۱۹	Cz	دیداری-لمسی	تقویت بتا و سرکوب آلفا	۱۰	۳۰	با گروه کنترل	۱۹	۲۴/۲	مرد و زن	عملکرد طبقه بندی	مبتدی	فوتبال
کریول ^۲ و همکاران	۲۰۱۹	C3 / C5	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و سرکوب تتا	۲۱	۲۰	با گروه کنترل	۵۰	۲۳/۶	مرد و زن	بهبود رانشناختی و توجه	مبتدی	رانندگی
چریستی ^۳ و همکاران	۲۰۱۹	C3 / C5	دیداری و شنیداری	تقویت بتا ۱ و ریتم حسی حرکتی و سرکوب بتا ۲ و تتا	۲۰	۳۰	با گروه کنترل	۱۲	۲۱	مرد	ضربه هاکی	خبره	هاکی روی یخ
ماسکزیک و همکاران	۲۰۱۸	O1 / O2	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و سرکوب تتا	۱۰	۲۵	با گروه کنترل	۱۸	۲۱	مرد	تعادل پویا	نیمه خبره	جودو
پالوچ و همکاران	۲۰۱۷	F3 / F4 / P3 / P4	دیداری	تقویت تتا و سرکوب آلفا	۸	۳۰	با گروه کنترل	۳۲	۲۱/۹	مرد	خلاقیت	نیمه خبره	همگانی
میکیسین و همکاران	۲۰۱۷	C3 / C4	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و بتا ۱ و سرکوب تتا و بتا ۲	۲۰	۲۰	با گروه کنترل	۳۵	۲۱/۵	مرد	توجه و زمان واکنش	مبتدی	فوتبال

1. Wang
2. Crivel
3. Christie

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع باز خورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
یاماشیتا ^۱ و همکاران	۲۰۱۷	Fz	شنیداری	تقویت تتا و سرکوب آلفا	۴	۴۰	با گروه کنترل	۳۰	۲۲/۷	مرد و زن	عملکرد شناختی و تغییرپذیری عملکردی	نیمه خبره	همگانی
ریجن ^۲ و همکاران	۲۰۱۶	C3 / C4 / Oz / P3 / P4	دیداری و شنیداری	تقویت آلفا	۹۴	۳۰	بدون گروه کنترل	۱۰	۲۲	مرد	عملکرد و کیفیت خواب	خبره	فوتبال
چنگ و همکاران	۲۰۱۵	Cz	شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی	۸	۴۵	بدون گروه کنترل	۱۴	۲۲/۳	مرد و زن	ضربه گلف	خبره	گلف
میکسین و همکاران	۲۰۱۵	C3 / C4	دیداری و شنیداری	تقویت بتا ۱ و ریتم حسی حرکتی و سرکوب بتا ۲ و تتا	۲۰	۳۰	با گروه کنترل	۵۰	۲۳/۸	مرد و زن	توجه و سرعت پردازش شناختی	خبره	شنا و کاراته
دکر ^۳ و همکاران	۲۰۱۴	C3 / C4	دیداری و شنیداری	تقویت آلفا	۱۰	۴۰	با گروه کنترل	۱۲	۲۲	مرد و زن	کیفیت خواب و آرماسازی روانی	نیمه خبره	ژیمناستیک
رینگ و همکاران	۲۰۱۴	Fz	دیداری و شنیداری	سرکوب آلفا	۳	۱	با گروه کنترل	۱۲	۲۳	مرد	ضربه گلف	خبره	گلف
گراسزیک ^۱ و همکاران	۲۰۱۴	F3 / F4	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و سرکوب تتا	۴	۶۰	با گروه کنترل	۱	۲۵	مرد	اعتماد به نفس	خبره	همگانی

1. Yamashita
2. Rijken
3. Dekker

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع بازخورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
همکاران		/ P3 / P4	شنیداری				کنترل			زن			
شی-چان کو ^۲ و همکاران	۲۰۱۴	FCz / Cz / Pz	شنیداری	سرکوب تتا	۱۱	۲۵	بدون گروه کنترل	۳	۲۲	مرد	ضربه گلف و اضطراب رقابتی	خبره	گلف
گرازلیبر ^۳ و همکاران	۲۰۱۳	Pz	شنیداری	تقویت تتا و سرکوب آلفا	۱۰	۲۰	با گروه کنترل	۱۲	۲۱	زن	اضطراب و خلاقیت	مبتدی	هنرهای نمایش
شرلین ^۴ و همکاران	۲۰۱۳	C3 / Cz / C4 / T3 / T4	دیداری و شنیداری	تقویت دلتا، تتا و ، آلفا و سرکوب بتا، بتا ۱ بتا ۲ و گاما	۱۵	۲۰	با گروه کنترل	۱۲	۲۸	مرد و زن	تغییرات الکتروانسفالوگرافی کمی و آزمون عملکرد پیوسته	خبره	بیس بال
گرازلیبر و همکاران	۲۰۱۳	Pz	دیداری و شنیداری	سرکوب آلفا و تتا و تقویت ریتم حسی حرکتی	۲۰	۱۵	با گروه کنترل	۱۲	۲۵/۲	مرد و زن	خلاقیت	مبتدی	هنرهای نمایش
رستمی و همکاران	۲۰۱۲	C3 / C4	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب	۱۵	۴۰	با گروه کنترل	۲۴	۳۰	مرد	رکورد تیراندازی	خبره	تیراندازی

1. Graczyk
2. Shih-Chun Kao
3. Gruzelier
4. Sherlin

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع باز خورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
فریدنیا و همکاران	۲۰۱۲	C3 / C4	دیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی سرکوب تتا و بتا - تقویت بتا و سرکوب بتا	۱۲	۴۵	با گروه کنترل	۲۰	۱۳/۵	زن	اضطراب رقابتی	نیمه خبره	شنا
غرایاق زندی و همکاران	۲۰۲۰	Pz	دیداری و شنیداری	سرکوب موج آلفا و تقویت موج تتا	۱۲	۳۰	با گروه کنترل	۴۵	۱۸	مرد	عملکرد پیوسته دیداری	نیمه خبره	فوتبال
نوروزی و همکاران	۲۰۱۸	F4	دیداری و شنیداری	سرکوب آلفا	۵	۲۰	با گروه کنترل	۲۰	۲۴/۸	مرد	فرایند حرکتی هشیار و امتیاز پرتاب دارت	نیمه خبره	دارت
موحدی	۲۰۱۸	Cz / O1 / F3 / F4 / Fz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و بتا و سرکوب تتا	۲۰	۳۰	با گروه کنترل	۳۰	۲۴/۶	مرد	خالقیت	مبتدی	فوتبال
فلاح و همکاران	۲۰۱۸	Pz / Cz	شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و بتای بالا - تقویت آلفا و تتا	۱۰	۲۰	با گروه کنترل	۲۴	۲۴	مرد و زن	توجه انتخابی و توزیع شده و پرتاب آزاد بسکتبال	نیمه خبره	بسکتبال
محمدی‌فر و همکاران	۲۰۱۸	Cz	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و ریتم حسی حرکتی و سرکوب	۱۶	۴۵	با گروه کنترل	۶۰	۲۰	مرد	کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی	مبتدی	فوتبال

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع بازخورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
نامدار طجری و همکاران	۲۰۱۷	O1 / O2 Cz / Fz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و بتا ۱	۱۲	۱۵	با گروه کنترل	۴۸	۲۵	مرد و زن	تعادل / زمان واکنش	نیمه خبره	دوومیدانی
افتاه حال و همکاران	۲۰۱۷	F4 / F3 / O1 / Cz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و بتا و سرکوب تتا	۲۰	۴۵	با گروه کنترل	۳۰	۲۰	مرد	زمان واکنش	نیمه خبره	فوتبال
کرمانی مامازندی	۲۰۱۷	CZ	دیداری و شنیداری	تقویت و بتا ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا	۱۶	۳۰	با گروه کنترل	۴۰	۲۰/۵	مرد	توجه و انعطاف پذیری شناختی	مبتدی	فوتبال
فغفوری آذر و همکاران	۲۰۱۷	T3 / Pz	شنیداری	تقویت آلفا - تقویت تتا و سرکوب آلفا	۱۲	۳۰	با گروه کنترل	۳۰	۳۰	زن	رکورد تیراندازی	خبره	تیر و کمان
تقی زاده و همکاران	۲۰۱۷	Cz	دیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و های بتا	۱۲	۳۰	با گروه کنترل	۱۶	۱۳/۲	مرد	دقت فورهند و بکهند	مبتدی	تنیس روی میز
پارسایی و همکاران	۲۰۱۷	Cz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا	۱۵	۳۰	با گروه کنترل	۱۶	۳۸	مرد	زمان واکنش دیداری و شنیداری	مبتدی	تنیس روی میز
طاهری و همکاران	۲۰۱۷	Cz / C4	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا	۳	۴۵	با گروه کنترل	۳۱	۱۸/۲	مرد و زن	کیفیت خواب و مهارت‌های روانشناختی	نیمه خبره	فوتبال

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع بازخورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
افتاده‌حال و همکاران	۲۰۱۶	Cz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و بتا و سرکوب تتا	۲۰	۲۰	با گروه کنترل	۳۰	۲۰	مرد	توجه مستمر	مبتدی	فوتبال
زادخوش و همکاران	۲۰۱۶	Pz	شنیداری	سرکوب آلفا و تقویت موج تتا	۱۲	۳۰	با گروه کنترل	۳۰	۱۸/۵	مرد	اضطراب و عملکرد شوت فوتبال	نیمه خبره	فوتبال
فلاح و همکاران	۲۰۱۶	Cz / Pz	دیداری و شنیداری	تقویت بتا و ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و بتای بلند	۱۰	۳۰	با گروه کنترل	۳۶	۲۴	مرد و زن	توجه و پرتاب آزاد بسکتبال	نیمه خبره	بسکتبال
امینی و همکاران	۲۰۱۵	C3 / Pz	شنیداری	تقویت تتا و سرکوب آلفا در - تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا	۱۵	۴۵	با گروه کنترل	۲۴	۲۱/۳	زن	پرتاب دارت	مبتدی	دارت
زارعی و همکاران	۲۰۱۵	PZ / C3	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا در ناحیه C3 و تقویت تتا و سرکوب آلفا در ناحیه Pz	۱۵	۲۰	با گروه کنترل	۴۵	۲۲/۳	مرد	پرتاب توپ بسکتبال	نیمه خبره	بسکتبال
محمدزاده و	۲۰۱۴	O1 / O2	دیداری و	تقویت بتا و ریتم حسی	۱۰	۳۰	با گروه	۲۴	۲۲	مرد و	ثبت امواج مغزی و	مبتدی	همگانی

پژوهشگر	سال	مکان الکتروود	نوع بازخورد	نوع پروتکل	تعداد جلسات	مدت مداخله	کنترل شرایط	تعداد نمونه	سن نمونه	جنس نمونه	ارزیابی عملکرد	سطح ورزشکار	نوع ورزش
همکاران			شنیداری	حرکتی / سرکوب تتا			کنترل			زن	تعادل پویا		
هاشمیان و همکاران	۲۰۱۳	Cz / Fz	دیداری	تقویت بتا ۱	۱۰	۱۵	با گروه کنترل	۳۶	۲۱/۳	زن	توجه	خبره	دو و میدانی
امینی و همکاران	۲۰۱۳	C3 / PZ	دیداری و شنیداری	تقویت تتا و سرکوب آلفا - تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا	۱۵	۲۰	با گروه کنترل	۲۴	۲۵/۳	مرد و زن	امتیاز پرتاب دارت	مبتدی	دارت
نبوی‌آل‌آقا و همکاران	۲۰۱۳	Cz	دیداری و شنیداری	تقویت ریتم حسی حرکتی و سرکوب تتا و بتا ۲	۲۰	۲۰	با گروه کنترل	۳۶	۲۲/۵	مرد و زن	عملکرد اجرایی و زمان واکنش	مبتدی	تنیس روی میز
فرخی و همکاران	۲۰۱۳	O1 / O2	دیداری و شنیداری	تقویت آلفا	۱۵	۱۲	با گروه کنترل	۳۶	۲۱/۵	زن	اضطراب	نیمه خبره	دو و میدانی

نتایج فرا تحلیل

جدول ۳- اندازه اثر مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران

Table 3 - Effect size of neurofeedback intervention on performance optimization of athlete



پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی
		Mean	SD	N	Mean	SD	N		

پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی	۲	۱	۰	-۱	-۲
		Mean	SD	N	Mean	SD	N							
میکيچين و همکاران	۲۰۲۰	۴/۱۳	۱/۰۷	۷	۴/۲۷	۰/۷۴	۷	۰/۷۹۹ [۱/۲۰۱ و -۰/۸۹۷]						
ماسکزيک و همکاران	۲۰۲۰	۰/۱۸۶	۰/۰۰۹	۱۲	۰/۱۹۴	۰/۰۱۲	۱۲	۱/۷۸۵ [-۰/۰۷۴ و ۱/۵۸۲]						
		۰/۱	۰/۰۰۸	۱۲	۰/۱۹۱	۰/۰۱۲	۱۲	۶/۶۰۴ [۶/۲۷۵ و ۱۱/۵۷۱]						
		۹۵/۱۱	۱۲/۲۴	۹	۸۲/۳۴	۱۵/۸۵	۹	۱/۸۲۳ [-۰/۰۶۸ و ۱/۸۷۲]						
		۳/۸۳	۰/۶۲	۹	۴/۸۸	۰/۸۵	۹	۲/۷۲۹ [۰/۴۰۷ و ۲/۴۸۲]						
ماسکزيک و همکاران	۲۰۱۸	۶/۰۱	۱/۶۹	۹	۷/۸	۲/۸۱	۹	۱/۵۸۰ [-۰/۱۸۶ و ۱/۷۳۰]						
		۴/۳۲	۱/۰۸	۹	۴/۴۴	۱/۲۲	۹	۰/۲۲۱ [-۰/۸۲۰ و ۱/۰۲۹]						
		۱۰/۷۵	۱/۰۲	۹	۹/۲۱	۱/۷۱	۹	۲/۱۶۴ [۰/۱۰۳ و ۲/۰۸۴]						
		۱/۲۲	۰/۴۴	۹	۱/۳۷	۰/۳۸	۹	۰/۷۶۸ [-۰/۵۶۷ و ۱/۲۹۶]						
		۲/۲۳	۰/۶۹	۱۷	۲/۹۳	۱/۷۷	۱۸	۱/۴۹۹ [-۰/۱۵۸ و ۱/۷۸۹]						
		۱/۹۸	۱/۰۱	۱۷	۱/۴۵	۰/۵۹	۱۸	۱/۸۶۱ [-۰/۰۳۴ و ۱/۳۲۶]						
		۲/۵۳	۱/۷۶	۱۷	۱/۷۷	۱/۶۲	۱۸	۰/۳۱۴ [-۰/۲۲۱ و ۱/۱۲۱]						
میکيچين و همکاران	۲۰۱۷	۰/۵۵	۰/۳۳	۱۷	۰/۳۶	۰/۲	۱۸	۰/۰۱۳ [-۰/۰۱۸ و ۱/۳۸۴]						
		۰/۹۲	۰/۴۷	۱۷	۰/۶۷	۰/۳۵	۱۸	۰/۷۵۲ [-۰/۰۷۲ و ۱/۲۸۴]						
		۰/۶۱	۰/۳۱	۱۷	۰/۵۴	۰/۲۱	۱۸	۰/۷۸۳ [-۰/۴۰۰ و ۰/۹۳۲]						
		۰/۳۵	۰/۲۷	۱۷	۰/۳۵	۰/۲۶	۱۸	۰/۰۰۰ [-۰/۶۶۳ و ۰/۶۶۳]						
ريچکن و همکاران	۲۰۱۶	۶/۵	۰/۴۲	۱۰	۶/۶	۱/۷	۱۰	-۰/۱۸۱ [-۰/۹۵۸ و ۰/۷۹۶]						
		۱/۸۲	۰/۳۳	۱۰	۱/۹۲	۰/۲۲	۱۰	۰/۷۹۱ [-۰/۵۲۷ و ۱/۲۴۰]						

پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی	۲	۱	۰	-۱	-۲
		Mean	SD	N	Mean	SD	N							
		۹/۸۱	۷/۷۱	۱۰	۲/۵۳	۲/۹۱	۱۰	[۰/۲۹۱ و ۲/۲۰۸]	۰/۵۵۵					
چنگ و همکاران	۲۰۱۵	۳/۴	۲/۱۷	۱۴	۳/۶	۲/۴۲	۱۴	[۰/۱۸۲۸ و -۰/۶۵۴]	۰/۲۳۰					
		۱۸/۶۴	۱/۸۲	۲۵	۱۳/۶	۳/۲	۲۵	[۱/۲۶۴ و ۲/۶۰۸]	۰/۶۴۹					
		۱۸/۱۶	۱/۹۷	۲۵	۱۴/۱۶	۳/۵۵	۲۵	[۰/۱۷۷۵ و ۲/۰۱۱]	۰/۴۱۹					
		۱۸/۴۴	۱/۵۲	۲۵	۱۴/۳۲	۴/۱۲	۲۵	[۰/۱۷۱۴ و ۱/۹۳۹]	۰/۲۴۷					
میکیسین و همکاران	۲۰۱۵	۱۸/۴۴	۱/۵۲	۲۵	۱۵/۳۲	۴/۳۸	۲۵	[۰/۳۶۷ و ۱/۵۳۷]	۰/۱۸۹					
		۱۴/۸۴	۴/۵۱	۲۵	۱۰/۰۴	۴/۴۱	۲۵	[۰/۴۸۳ و ۱/۶۶۹]	۰/۵۵۶					
		۱۷/۲	۳/۰۶	۲۵	۱۳/۷۲	۳/۵۲	۲۵	[۰/۴۶۳ و ۱/۶۴۷]	۰/۴۹۵					
		۱۸/۶۴	۱/۵۵	۲۵	۱۴/۸۴	۳/۱۸	۲۵	[۰/۱۸۹۰ و ۲/۱۴۸]	۰/۷۳۲					
دکر و همکاران	۲۰۱۴	۵	۰/۲۹	۱۲	۰/۷۳	۰/۰۵۶	۱۲	[۰/۴۰۵ و ۱/۲۱۲]	۰/۹۷۹					
		۷	۰/۳	۱۵	۹	۰/۵	۱۵	[۳/۴۳۰ و ۶/۳۷۲]	۶/۶۹۱					
شی-چان کو و همکاران	۲۰۱۴	۱۲	۰/۶	۱۵	۱۴	۰/۰۳	۱۵	[۳/۳۱۸ و ۶/۰۹۸]	۶/۶۴۰					
		۹/۷۳	۰/۱۳	۱۲	۹/۴۸	۰/۲۶	۱۲	[۰/۳۴۵ و ۲/۰۸۷]	۲/۷۳۷					
فریدنیا و همکاران	۲۰۱۲	۱۶/۷	۱/۷۵	۱۰	۱۸/۸	۲/۷۴	۱۰	[۰/۰۰۸ و ۱/۸۳۵]	۱/۰۳۷					
		۹/۱	۳/۵	۱۰	۸/۲	۲/۶	۱۰	[۰/۵۸۹ و ۱/۱۷۳]	۰/۶۴۹					
نوروزی و همکاران	۲۰۱۸	۱/۹	۲/۴	۱۰	۴/۳	۱/۴	۱۰	[۰/۲۶۷ و ۲/۱۷۶]	۲/۵۰۸					
موحدی و همکاران	۲۰۱۸	۱۳۹/۲	۶/۲۱	۱۵	۱۳۲/۶	۴/۱۳	۱۵	[۰/۴۶۹ و ۲/۰۳۴]	۳/۱۳۴					

پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی	۲	۱	۰	-۱	-۲
		Mean	SD	N	Mean	SD	N							
فلاح و همکاران	۲۰۱۸	۶/۸۹	۲/۱	۱۲	۴/۷	۷/۵	۱۲	۱/۳۴۸ [-۰/۴۱۰ و ۱/۲۰۶]						
کرمانی‌مامازندی و همکاران	۲۰۱۸	۳۳/۴	۲/۳	۲۰	۳۰/۶۵	۳/۱۳	۲۰	۲/۹۸۵ [۰/۳۴۴ و ۱/۶۵۹]						
		۲۳۸/۷۵	۳۲/۱۳	۱۲	۲۶۰/۵	۲۰/۵۳	۱۲	۱/۲۷۱ [-۱/۶۳۹ و ۰/۲۵]						
نامدارطجری و همکاران	۲۰۱۷	۳۳۴/۳۳	۲۵/۷۸	۱۲	۳۵۵/۹	۱۵/۸۵	۱۲	۱/۲۲۰ [-۱/۸۵۷ و -۰/۱۵۹]						
		۰/۵۴	۰/۰۴	۱۲	۰/۶۷	۷/۰۷	۱۲	۰/۸۳۳ [-۳/۳۰۸ و -۱/۲۵۳]						
	۲۰۱۷	۳۷۲/۷۳	۵۹/۵۹	۱۵	۴۱۲	۴۶/۲۴	۱۵	۱/۹۵۱ [-۰/۰۰۳ و ۱/۴۷۶]						
		۲۸۴/۴	۲۵/۹۶	۱۵	۲۸۴/۹۳	۳۲/۵۹	۱۵	۳/۱۱۰ [۰/۴۵۸ و ۲/۰۲۱]						
افتاده‌حال و همکاران		۲۶۴/۶۷	۷۷/۱۵	۱۵	۳۴۹/۰۷	۸۱/۲۷	۱۵	۲/۷۳۰ [۰/۳۰۰ و ۱/۸۳۰]						
		۱۹۹/۰۷	۸۹/۷۴	۱۵	۲۶۹/۶۷	۱۰۴/۲۵	۱۵	۱/۹۲۵ [-۰/۰۱۳ و ۱/۴۶۵]						
		۱۶۰/۶	۵۱۴۶	۱۵	۱۹۴/۳۳	۴۸/۱۱	۱۵	۰/۰۲۵ [-۰/۷۰۶ و ۰/۷۲۵]						
	۲۰۱۷	۰/۷	۲/۸۱	۲۰	۳	۶/۷۹	۲۰	۱/۳۸۳ [-۰/۱۸۵ و ۱/۰۷۰]						
کرمانی‌مامازندی		۲۳/۳۵	۱۸/۰۳	۲۰	۱۵/۳۵	۲۳/۳۸	۲۰	۱/۲۰۱ [-۰/۲۴۲ و ۱/۰۰۹]						
		۱/۵۵	۲/۲۳	۲۰	۳/۵۵	۳/۰۷	۲۰	۲/۲۷۹ [۰/۱۰۴ و ۱/۳۸۶]						
فغفوری آذر و همکاران	۲۰۱۷	۳۲۲/۱	۹/۵۲	۱۰	۳۱۰/۹	۴/۵	۱۰	۲/۹۷۰ [۰/۵۱۱ و ۲/۴۹۷]						
	۲۰۱۷	۳۲۲/۹۲	۶۰/۱۷	۸	۳۸۸/۱۱	۶۰/۹۶	۸	۲/۰۱۲ [۰/۰۲۸ و ۲/۱۲۵]						
		۴۸۸/۱۲	۴۰/۳۵	۸	۶۲۲/۲	۷۳/۵۹	۸	۳/۵۳۱ [۱/۰۰۵ و ۳/۵۱۴]						
پارسایی و همکاران		۴۰۳/۱۵	۳۳/۳۹	۸	۶۲۶/۲	۷۳/۵۹	۸	۴/۵۸۱ [۲/۲۳۳ و ۵/۵۷۴]						
		۶۱۵/۱۲	۴۶/۰۴	۸	۸۱۳/۲۲	۷۳/۷۷	۸	۴/۲۵۱ [۱/۷۳۶ و ۴/۷۰۷]						

پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی	مطالعه				
		N	SD	Mean	N	SD	Mean			۲	۱	۰	-۱	-۲
طاهری و همکاران	۲۰۱۷	۱۶	۳/۳	۲۴/۲	۱۵	۲/۸	۱۶/۲	۰/۹۵۹	[۳/۵۶۵ و ۱/۶۴۹]	—				
		۱۶	۳/۱	۱۷/۸	۱۵	۳/۴	۱۷/۲	۱/۷۶۶	[۰/۸۹۱ و -۰/۵۲۱]	—				
افتاده‌حال و همکاران	۲۰۱۶	۱۵	۰/۸۳	۲/۵۳	۱۵	۱/۲	۳/۸	۱/۴۴۴	[۲/۰۱۱ و ۰/۴۵۰]	—	+	+		
		۱۵	۰/۸۴	۲	۲/۸۹۷	۱۵	۰/۷۹	۲/۹۳	۱/۴۷۸	[۱/۹۱۲ و ۰/۳۶۹]	—	+	+	
زاد خوش و همکاران	۲۰۱۶	۱۵	۰/۹۶	۳/۰۶	۱۵	۱/۲۴	۴/۴	۱/۴۵۳	[۱/۹۸۷ و ۰/۴۳۰]	—	+	+		
		۱۵	۱۴/۲	۴۷/۶۶	۱۵	۱۴/۰۴	۴۴/۸۳	۱/۷۰۹	[۰/۹۱۸ و -۰/۵۱۷]	—	+	+		
امینی و همکاران	۲۰۱۵	۱۵	۴۰/۵۵	۷۶/۶۶	۱۵	۲۶/۸۶	۶۹/۱۶	۱/۷۰۸	[۰/۹۳۶ و -۰/۵۰۰]	—	+	+		
		۱۲	۵۲/۳	۱۳۵/۷۵	۱۲	۲۷/۳۹	۱۳۰	۱/۳۷۱	[۰/۹۳۹ و -۰/۶۶۳]	—	+	+		
محمد زاده و همکاران	۲۰۱۴	۱۲	۱۷/۳۹	۸۵/۳۴	۱۲	۱۲/۲۵	۸۸/۶	۱/۳۶۶	[۱/۰۱۹ و -۰/۵۸۶]	—	+	+		
		۱۲	۱/۱۵	۴/۴۵	۱۲	۱/۷	۴/۳۶	۱/۳۷۴	[۰/۸۶۲ و -۰/۷۳۸]	—	+	+		
	۲۰۱۴	۱۲	۰/۵۲	۳/۸۳	۱۲	۰/۸۸	۴/۱۱	۱/۳۴۹	[۱/۱۹۵ و -۰/۴۲۰]	—	+	+		
		۱۲	۱/۷۹	۶/۴۲	۱۲	۲/۸۱	۷/۸	۱/۳۱۸	[۱/۴۰۳ و -۰/۲۳۱]	—	+	+		
	۲۰۱۳	۱۲	۰/۳۴	۱/۳۶	۱۲	۰/۵۶	۱/۶	۱/۳۳۰	[۱/۳۳۲ و -۰/۲۹۵]	—	+	+		
		۱۲	۲/۰۲	۷/۸۵	۱۲	۲/۹۱	۹/۹۷	۱/۲۶۱	[۱/۶۸۲ و ۰/۰۱۱]	—	+	+		
هاشمیان و همکاران	۲۰۱۳	۱۲	۱۰/۰۵	۱۶۵/۵۸	۱۲	۳/۵۳	۱۶۰/۵۵	۱/۳۰۲	[۱/۴۹۰ و -۰/۱۵۴]	—	+	+		
نبوی‌آل‌آقا و همکاران	۲۰۱۳	۱۲	۴۹/۹۸	۲۸۷/۴۴	۱۰	۷۰/۲	۲۹۶/۷۸	۱/۲۴۶	[۰/۹۹۶ و -۰/۶۸۵]	—	+	+		
فرخی و همکاران	۲۰۱۳	۱۲	۱/۷۲	۱۷/۷۵	۱۰	۱/۰۴	۱۰/۶۶۳	۰/۳۱۷	[۳/۲۰۸ و ۶/۵۴۱]	—	+	+		
		۱۲	۳/۹۶۱	۳/۶۶۶	۱۲	۳/۹۴۹	۰/۳	۱/۲۶۰	[۱/۶۸۷ و ۰/۰۱۵]	—	+	+		

پژوهشگر	سال	نوروفیدبک			کنترل			وزن مطالعه	اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی
		Mean	SD	N	Mean	SD	N		
									$M=0/798$ و $P \leq 0/001$ 
									$M=0/903$ و $P \leq 0/001$ 

*برخی مقالات به دلیل تعدد متغیر، تکرار شده‌اند.


جدول ۴- آماره‌های اندازه اثر ثابت و تصادفی فراتحلیل تأثیر مداخله نوروفیدبک بر بهبود عملکرد ورزشکاران
Table 4: Statistics of fixed and random Effect size meta-analysis of the effect of neurofeedback intervention on performance improvement in athletes

ناهمگونی		آزمون فرض صفر (۲ دامنه)		اندازه اثر و فاصله اطمینان ۹۵ درصدی			مدل					
I-squared	P-value	df (Q)	Q-value	P-value	Z-value	حد بالا	حد پایین	واریانس	خطای استاندارد	برآورد نقطه‌ای	تعداد مطالعه	اثر
۷۸/۰۶۵	۰/۰۰۱	۲۷	۱۶۸۹	۰/۰۰۱	۱/۷۷۸	۱/۸۴۹	۱/۶۶۱	۰/۰۰۲	۰/۰۴۸	۰/۷۵۵	۲۸	ثابت
			۳۲۳		۱۵	۰	۰					
				۰/۰۰۱	۸/۲۷۲	۱/۰۶۷	۱/۶۵۹	۰/۰۱۱	۰/۱۰۴	۰/۸۶۳	۲۸	تصادفی
						۱	۰					ی

مطالعات مورد بررسی در سطوح ۰/۹۵ تا ۰/۹۹ درصد معنادار هستند و همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد میانگین اندازه اثر کلی تمام این ۴۶ مطالعه، در مدل اثرات ثابت در سطح $P < 0.001$ معنادار است. بالاترین اندازه اثر در ۲۸ مطالعه مورد بررسی مربوط به مطالعه ماسکزیک و همکاران (۲۰۲۰) (۶/۶۰۴) است. برای بررسی ناهمگونی مطالعات از شاخص Q استفاده شد (جدول ۴). شاخص Q برای ۲۸ مطالعه با درجه آزادی ۲۷ برابر با ۳۲۳/۶۸۹ محاسبه شد که در سطح $P < 0.001$ معنادار است. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر همگنی مطالعات رد می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که مطالعات مورد بررسی، نامتجانس و ناهمگون هستند. هر چند تعداد مطالعات کم نیست، با این حال، آماره I نیز محاسبه شد که مقدار آن ۷۸/۰۶۵ است که بازهم نشان‌گر ناهمگونی بسیار قابل توجه در مطالعات است. بدین ترتیب مطالعات مورد بررسی در یک اندازه اثر حقیقی مشترک هستند و تفاوت‌های اندازه اثر مشاهده شده ناشی از خطای نمونه‌گیری است. از سوی دیگر، محاسبه‌های مربوط به اثر تصادفی معنادار بودند. در مجموع از مدل اثرهای ثابت استفاده و نسبت به جستجوی متغیرهای تعدیل کننده اقدام شد. تصادفی یا غیر تصادفی بودن به‌عنوان متغیر تعدیل کننده نتایج در نظر

جدول ۳ فراتحلیل مطالعات اثر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران در ۲۸ مطالعه را نشان می‌دهد. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده در زمینه اثر مداخلات نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران برای مدل اثرات ثابت برابر با $(Z=15/778)$ و معنادار ($P=0.001$) است و برای اثرات تصادفی برابر با $(Z=8/272)$ و معنادار ($P=0.001$) است که نشان دهنده ناهمگونی مطالعات است (هومان، گنجی و امیدفر، ۲۰۱۳). بدین ترتیب فرضیه صفر مبنی بر اینکه متوسط کلی اندازه اثر در گروه‌های کنترل و مداخله تفاوت ندارد، رد می‌شود. بر اساس کوهن (۱۹۸۸) برای تفسیر معناداری عملی اندازه اثر، ارزش‌های d بالا نشانگر میزان اندازه اثر هستند (سیادتیان، قمارانی و یعقوبیان، ۲۰۱۳). بنابراین حد بالای اندازه اثر ثابت پژوهش حاضر (۰/۸۴۹) را می‌توان به‌عنوان تأثیر زیاد اثر مداخلات نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران تفسیر کرد. به استثنای مطالعه میکیچین و همکاران (۲۰۲۰)، ماسکزیک و همکاران (۲۰۱۸)، میکیچین و همکاران (۲۰۱۷)، ریچکن و همکاران (۲۰۱۶)، کرمانی‌مامازندی و همکاران (۲۰۱۸)، پارسایی و همکاران (۲۰۱۷)، هاشمیان و همکاران، (۲۰۱۳)، نبوی‌آل‌آقا و همکاران (۱۳۹۲) و فرخی و همکاران (۲۰۱۳) اندازه اثر سایر

گرفته شد.



شکل ۲- نمودار منحنی اندازه اثر مطالعات خطای استاندارد میانگین در مدل اثرات ثابت تأثیر مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران

Figure 2- the curve of the Effect size of mean standard error studies in the model of fixed effects of the effect of neurofeedback intervention on performance optimization of athletes

مطالعات مورد استفاده باشد. آزمون N ایمن از خطای کلاسیک نیز نشان داد که تفاوت بین مطالعات مشاهده شد ($N=28$) و مطالعات جافتاده ($N=712$) قابل توجه است ($Z=15/778$ ، $P=0/001$).

برای بررسی تورش چاپ و انتشار، نمودار کیفی توسط نرم افزار جامع فراتحلیل ترسیم شد (شکل ۲) و از آزمون N ایمن از خطای کلاسیک استفاده شد. همانگونه که در نمودار منحنی اندازه اثر نشان داده شده است، پژوهش حاضر تا حدودی دارای تورش چاپ و انتشار است. این امر می‌تواند ناشی از حجم نمونه

جدول ۵- آماره‌های اندازه اثر مداخله نوروفیدبک مؤثر بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران

Table 5: statistics of the Effect size of neurofeedback intervention on optimizing athletes' performance

تعداد مطالعه	مداخله مؤثر بر عملکرد ورزشکاران	حد بالای اندازه اثر	حد پایین اندازه اثر	تفسیر بر اساس نظر کوهن
	کل (اندازه ثابت)	۰/۸۴۹	۰/۶۶۱	بزرگ
۲۸	نوروفیدبک	۱/۰۶۷	۰/۶۵۹	بزرگ
	کل (اندازه تصادفی)			

مطابق نتایج فرا تحلیل حاضر مداخله نوروفیدبک بر برخی کارکردهای شناختی؛ کارکردهای رسون‌شناختی؛ کارکردهای فیزیولوژیکی و نتایج عملکردی ورزشکاران تأثیرگذار است. نمایه پارامترهای ساختاری در خصوص اجرای یک مداخله استاندارد مداخله نوروفیدبک برای بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران مبتنی بر فرا تحلیل حاضر در شکل ۳ ارائه شده است:

در جدول ۵، تعداد مطالعات مداخله نوروفیدبک و حد بالای اندازه اثر نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مداخله نوروفیدبک با حد بالای اندازه اثر ۰/۸۴۹ به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر بر عملکرد ورزشکاران در مطالعات محسوب می‌شود.

مدل نظری




شکل ۳- نمایه پارامترهای ساختاری در خصوص اجرای مداخله نوروفیدبک برای بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران
Figure 3 - Index of structural parameters regarding the implementation of neurofeedback intervention to optimize the performance of athletes

شکل ۴ خصوص اثربخشی چندمتغیری نشان داده شده است. شکل ۴ الگوی ارائه شده در خصوص اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران و ضرایب مسیر در میان متغیرها را نشان می‌دهد.

در ادامه نمایه معادلات ساختاری به دست آمده از نتایج حاصل از مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران ارائه شده است. همان‌طور که یافته‌های حاصل از فرا تحلیل نشان داد، مداخله نوروفیدبک نسبت به برخی از متغیرهای مربوط به نتایج عملکردی و همچنین فرایندهای زیربنایی عملکردی همچون کارکردهای شناختی؛ روان‌شناختی و فیزیولوژیکی در سطح ۰/۰۱ اثر معنادار است. جهت آزمون هم‌زمان انگاره اثربخشی مفروض‌ها در پژوهش حاضر، روش الگویابی معادلات ساختاری اعمال گردید. این تحلیل‌های اثربخشی، در قالب مدل متغیرهای مستقل^۱ و به صورت مدل‌های تحلیل مسیر^۲ یک‌طرفه^۳ در

1. Independent
2. Path Analysis
3. Recursive



شکل ۴- الگوی تحلیل مسیر اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران

Figure 4 - Pattern analysis path of the effectiveness of neurofeedback intervention on optimizing the performance of athletes

دارد. بررسی‌های نظام‌دار و فراتحلیل گذشته نشان داده بود که مداخله نوروفیدبک روشی مؤثر برای بهبود مؤلفه‌های عملکردی در نمونه‌های بالینی (آرنس^۲ و همکاران، ۲۰۰۹) و بهبود عملکرد در آزمایشات پزشکی (روگالا و همکاران، ۲۰۱۶) است. همچنین بررسی‌های نظام‌دار و فراتحلیل کاربرد مداخله نوروفیدبک در حوزه ورزش نیز توسط میری‌فر و همکاران (۲۰۱۷) و ژانگ و همکاران (۲۰۱۸) انجام شده است. با این وجود اندازه اثر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشی در ابعاد مختلف عملکردی هنوز نامشخص بود و سؤالات زیادی بدون پاسخ مانده است. بنابراین، هدف از فراتحلیل حاضر ارزیابی اندازه اثر مداخله نوروفیدبک به عنوان یکی از انواع مداخلات شناختی بر عملکرد ورزشکاران بود.

بحث و نتیجه‌گیری

فرا تحلیل حاضر نشان داد که اندازه‌های اثر برای آزمایش یک فرضیه خاص ترکیب شده‌اند؛ بنابراین، می‌توان تعدادی پژوهش را با استفاده از همان متغیر انجام داد و نتایج را می‌توان در پژوهشی واحد ترکیب کرد (زانگ، هو، لیاو، لیاو و هو^۱، ۲۰۱۸). نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که مداخله نوروفیدبک بر برخی از متغیرهای مربوط به نتایج عملکردی و همچنین فرایندهای زیربنایی عملکردی همچون کارکردهای شناختی، روان‌شناختی و فیزیولوژیکی ورزشکاران تأثیر معنی‌دار دارد. نتایج این فرا تحلیل با مطالعات قبلی در مورد اثربخشی مداخله نوروفیدبک مطابقت

2. Arns

1. Xiang, Hou, Liao, Liao, & Hu

با وضعیت عملکرد نوع ۱ که توسط مدل برنامه چند اقدام^۵ پیشنهاد شده (برتولو^۶ و همکاران، ۲۰۱۶) و نشان می‌دهد که کنترل هوشیارانه کمتر تکالیف روانی-حرکتی به عملکرد مطلوب خودکار حرکتی مربوط است. در تحلیل پژوهش حاضر نیز، برخی از مطالعات که مداخله را در باند ریتم حسی حرکتی اعمال کردند، تأثیر مثبت مداخله نوروفیدبک را بر عملکرد ورزشی نشان دادند. همچنین یک مطالعه نیز که ریتم حسی حرکتی را در مداخله نوروفیدبک تقویت نمود، یک باند منفرد را با افزایش ریتم حسی حرکتی در منطقه CZ اعمال کرد و بهبود قابل توجهی در عملکرد گلف‌بازان مشاهده نمود (چنگ و همکاران، ۲۰۱۵). سایر مطالعات از باند ریتم حسی حرکتی همراه با سایر باندهای الکتروانسفالوگرافی استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، تقویت ریتم حسی حرکتی و همزمان مهار بتا در مناطق C3 و C4 منجر به عملکرد بهتر تیراندازان با تفنگ می‌شود (رستمی و همکاران، ۲۰۱۲). علاوه بر این، همزمان با تقویت ریتم حسی حرکتی، در مناطق C3 و C4، بتا و تتا بالا سرکوب می‌شوند، این عمل منجر به تغییرات قابل توجهی در تعامل خودکار^۷ (میکسین و همکاران، ۲۰۱۵) و کاهش اضطراب ورزشی^۸ در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می‌شود (فریدنیا، ۲۰۱۲). با این حال، یک مطالعه توسط پل و همکاران^۹ (۲۰۱۱)، پیشنهاد کرد که تقویت^{۱۰} ریتم حسی حرکتی و سرکوب^{۱۱} بتا و تتا بالا در منطقه CZ، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ضربه توپ^{۱۲} در گروه آزمایش ندارد. هرچند، مطالعه آن‌ها تأثیر مهمی بر وضعیت روانشناختی^{۱۳}، از جمله انگیزندگی رقابت^{۱۴} و لذت رقابت^{۱۵} نشان داد. به طور خلاصه، این نتایج نشان می‌دهد که

نتایج این فراتحلیل نشان داد که مداخله نوروفیدبک می‌تواند باعث شود تا ورزشکاران با موفقیت خود را در تغییر قدرت باندهای فرکانسی الکتروانسفالوگرافی توانمند کنند و به طور مؤثر عملکرد ورزشی خود را بهبود بخشند. این نتیجه معیار اثربخشی مداخله نوروفیدبک را که تغییر همزمان در قدرت الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی است، برآورده می‌کند. در این پژوهش مشخص شد که، محققان از باندهای الکتروانسفالوگرافی، از جمله ریتم حسی حرکتی، آلفا و تتا در مداخلات نوروفیدبک بیشتر استفاده می‌کنند. از این میان، باندهای ریتم حسی حرکتی و آلفا بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد ورزشی داشتند (چنگ و همکاران، ۲۰۱۵).

ریتم حسی حرکتی نوار فرکانسی قشر حسی-حرکتی است که با فعالیت قشر حسی-حرکتی رابطه معکوس دارد (استرمن^۱، ۱۹۹۶) و منعکس کننده این است که فعالیت هسته تالاموس پایین^۲ با تداخل کمتری در پردازش حسی مرتبط است (کوبر^۳ و همکاران، ۲۰۱۵). بنابراین، قدرت بیشتر ریتم حسی حرکتی به عنوان حالت ذهنی سازگار پردازش عصبی مربوط به تکالیف ورزشی در طی فعالیت‌های مربوط به توجه و مهارت‌های روانی-حرکتی^۴ مشخص شده است (چنگ و همکاران، ۲۰۱۷). در حوزه ورزش، پژوهش‌های قبلی نشان داده بود که قدرت ریتم حسی حرکتی بالاتر در مرحله نهایی آماده‌سازی با عملکرد بهتر در پرتاب دات (چنگ و همکاران، ۲۰۱۵)، ضربه گلف (چنگ و همکاران، ۲۰۱۵) و تیراندازی با تپانچه بادی (چنگ و همکاران، ۲۰۱۷) همراه است. بنابراین بر اساس نقش عملکردی ریتم حسی حرکتی، چنگ و همکاران (۲۰۱۷) پیشنهاد کردند که قدرت ریتم حسی حرکتی بالاتر می‌تواند به عنوان شاخصی از کارایی روانی-حرکتی بالاتر در حین اجرای مهارت‌های حرکتی شناخته شود (چنگ و همکاران، ۲۰۱۷).

همچنین اثر ریتم حسی حرکتی تقویت شده بر عملکرد ورزشی

5. The Multi-Action Plan (MAP) Model

6. Bertollo

7. Autotelic Engagement

8. Sport Anxiety

9. Paul Et Al.

10. Increasing

11. Inhibiting

12. Shot

13. Psychological Status

14. Competition Arousal

15. Competition Pleasure

1. Sterman

2. Lower Thalamic Nucleus

3. Kober

4. Psychomotor

دیگر نشان داد که تقویت آلفا تأثیر مهمی بر بهبود فعالیت‌های هماهنگ پیچیده در ژیمناست‌های خبره ایجاد می‌کند (استریژکوا^۸ و همکاران، ۲۰۱۲). علاوه بر این، سرکوب آلفا ضمن تقویت تتا در منطقه Pz، عملکرد بهتری را در ورزشکاران باله نشان داد (ریموند^۹ و همکاران، ۲۰۰۵). با این حال، مطالعه دیگری که در مورد اجراکنندگان باله انجام شد و پروتکلی مشابه پژوهش قبل را اعمال نمود، نتوانست اثر مثبت مداخله نوروفیدبک را بر عملکرد اجراکنندگان باله نشان دهد (گرازیلر، ۲۰۱۴). علاوه بر این، سرکوب آلفای بالا در کنار تتا در منطقه Pz نیز نتوانست به طور انتخابی عملکرد گلف‌بازان را افزایش دهد (رینگ و همکاران، ۲۰۱۵).

به طور خلاصه، فراتحلیل حاضر نشان داد که مطالعات منتشر شده از اثربخشی مداخله نوروفیدبک در بهینه‌سازی عملکرد ورزشی پشتیبانی می‌کنند. این یافته از فرضیه کارایی روان-حرکتی حمایت می‌کند که پیشنهاد می‌کند توسعه مهارت حرکتی از طریق تمرین با اصلاحات فیزیولوژیکی همراه است که در آن فرایندهای بی‌ربط سرکوب می‌شوند و فرایندهای مربوطه تقویت می‌شوند (برادلی، هاتفیلد و کریک^{۱۰}، ۲۰۰۷).

نتیجه این که پس از مداخله نوروفیدبک، پردازش قشر مغز کارآمدتر شده که شاخص عملکرد بهتر ورزشی است. در این حالت به نظر می‌رسد که تداخل کمتری رخ داده و پردازش قشر بیشتر به تکالیف مربوط و عوامل اساسی تشکیل دهنده عملکرد بهینه می‌پردازد. با این حال، با توجه به محدودیت‌های پژوهش، هنگام تفسیر این یافته، باید احتیاط کرد، زیرا امکان تفسیر نادرست وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها این است که اکثر مطالعات مربوط به مداخله نوروفیدبک از گروه‌های کنترل غیرفعال استفاده کرده‌اند که اثر مداخله نوروفیدبک را با اثر هیچ تکلیف دیگری مقایسه نمی‌کنند. بنابراین، فراتحلیل باید اندازه اثر را برای تعدیل شرایط طراحی گروه کنترل بررسی کند.

افزایش قدرت ریتم حسی حرکتی (یا کاهش همزمان بتا / تتا) توسط مداخله نوروفیدبک، باعث مهار پردازش حسی و حرکتی شده (کوبر و همکاران، ۲۰۱۵)، لذا به نظر می‌رسد مداخله نوروفیدبک پردازش آگاهانه را کاهش داده و باعث افزایش پردازش خودکار در اجرای مهارت حرکتی شده، که این نتیجه منجر به بهبود عملکرد ورزشی می‌شود.

فرکانس آلفا، ریتم غالب در الکتروانسفالوگرافی است و به طور کلی با مهار فعالیت عصبی قشر همراه است تا کنترل شناختی عملکرد نهایی را اعمال کند (کلیمسچ^۱، ۱۹۹۷). به عنوان مثال، پژوهش‌های قبلی نشان داد که ورزشکاران خبره در مقایسه با ورزشکاران تازه‌کار، هنگام آماده‌سازی برای اجرای حرکت، قدرت آلفا را در مناطق گیجگاهی^۲ قشر بالاتر می‌برند (یعنی سرکوب بیشتر^۳) و قدرت آلفا را در مناطق مرکزی^۴ قشر کاهش می‌دهند (یعنی سرکوب کمتر^۵) (کوک و همکاران، ۲۰۱۴). بنابراین، الگوی فعالیت قشر مغز در سراسر پوست سر که در آن مهار به موقع برخی از فعالیت‌های بی‌ربط در مناطق قشر مغز (به عنوان مثال، مناطق گیجگاهی) و عدم مهار فعالیت‌های مربوط به تکلیف در مناطق قشر مغز (به عنوان مثال، مناطق مرکزی) می‌تواند به بهینه‌سازی عملکرد حرکتی ورزشکاران خبره مربوط باشد (گالیچیو، کوک و رینگ^۶، ۲۰۱۷). در فراتحلیل حاضر، برخی از مطالعات مورد بررسی که باند آلفا را برای اعمال انتخاب نموده بودند، تأثیر مؤثری بر عملکرد ورزشی نشان دادند. در پژوهش رستمی و همکاران (۲۰۱۲) از کراس اور ترینینگ^۷ (تغییر از یک پروتکل به پروتکل دیگر) استفاده شده که متشکل از تقویت فرکانس آلفا و تتا بود در حالی که بتا بالا در منطقه Pz سرکوب می‌شد. این فرایند باعث بهبود عملکرد تیراندازی با تفنگ شد (رستمی و همکاران، ۲۰۱۲). همچنین، نتایج پژوهش

1. Klimesch
2. Temporal Regions
3. More Inhibition
4. Central Regions
5. Less Inhibition
6. Gallicchio, Cooke, & Ring
7. Crossover Training

8. Strizhkova
9. Raymond
10. Bradley, Hatfield & Kerick

دارد که اثر مداخلات نوروفیدبک در عملکرد ورزشی تفاوت معناداری در مطالعات کنترل شده با گروه کنترل فعال / دارونما نداشته باشد. در این صورت شواهد مربوط به تأثیر پروتکل‌های الکتروانسفالوگرافی خاص در بهبود عملکرد ورزشی نسبتاً ضعیف بوده و بر نیاز به پژوهش‌های گسترده‌تر تأکید می‌کند. با این حال، یافته‌های پژوهش حاضر با نتیجه‌گیری‌های انجام شده توسط کورتس و همکاران (۲۰۱۶) که مداخله نوروفیدبک را رویکرد موثری برای بهبود عملکرد ورزشکاران معرفی می‌کند مطابقت دارد (کورتس و همکاران، ۲۰۱۶ و تقی‌زاده، ۱۳۹۸). بر اساس این یافته‌ها، بهتر است برای همه مطالعاتی که قرار است در حوزه مداخله نوروفیدبک اجرا شود از یک گروه کنترل فعال / دارونما استفاده شود تا از بروز برخی خطاهای ناخواسته هم‌چون اثرات غیر فعال بودن گروه کنترل، سوگیری آزمون‌گر و غیره جلوگیری شود.

لذا پیشنهاد می‌شود اندازه اثر عملکرد ورزشی به عنوان اندازه‌گیری در گروه مداخلات نوروفیدبک، منهای اندازه‌گیری مشابه در گروه کنترل فعال / دارونما محاسبه شود. بدون چنین کمیتی، نتایج تجربی قادر به ارائه شواهد محکم در مورد اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران نیستند. مداخله نوروفیدبک برای بهبود کارکردهای شناختی، روانی و فیزیولوژیکی به ورزشکاران کمک می‌کند تا برای اجرای مهارت‌ها و تکالیف شناختی (ادراک، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری) و از طرف دیگر برای عملکرد مناسب فیزیکی و حرکتی (هدف‌گیری، پرتاب، دریافت و ...) آماده‌تر شوند. از آنجاکه مداخله نوروفیدبک با اثرگذاری بر مغز باعث بهبود فرایندهای متعددی شده و در کنترل بدن و رفتار حرکتی نیز ایفای نقش می‌کند، می‌توان از طریق آن ورزشکاران را جهت رویارویی با استرسورهای مختلف، بدون کاهش عملکرد، آماده نمود. بنابراین حفظ قابلیت‌های ورزشکار در برابر عوامل استرس‌زا و همچنین ریکاوری پس از تجربه موقعیت استرس‌زا، از طریق مداخله نوروفیدبک امکان‌پذیر است.

به‌طور کلی، مداخله نوروفیدبک می‌تواند باعث تغییر قدرت

با وجود حجم گسترده‌ای از مطالعات که به بررسی اثربخشی مداخلات نوروفیدبک در حوزه ورزش پرداخته‌اند، فراتحلیل حاضر تنها معدودی از مطالعات را شناسایی نمود که به خوبی کنترل شده بودند. محققان در بررسی کاربردهای مداخله نوروفیدبک در محیط‌های بالینی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند. به عنوان مثال، نیو^۱ (۲۰۱۳) قصد داشت تا میزان کارآیی مداخله نوروفیدبک را در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی (به عنوان مثال اختلال استرس پس از سانحه و اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه، اوتیسم، مصرف مواد و مشکلات یادگیری) بررسی کند، فراتحلیل صورت گرفته توسط آن‌ها نیز فقط شامل ۲۲ آزمایش کنترل شده مناسب بود و به گفته آن‌ها، شرایط کنترل شده در پژوهش‌ها به‌خوبی اعمال نشده بود.

فراتحلیل‌هایی که توسط لفتاوس و همکاران^۲ (۲۰۱۲) و کورتس و همکاران (۲۰۱۶)، که اثرات مداخله نوروفیدبک اعمال شده را در بیماران مبتلا به اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه بررسی کردند، به ترتیب تنها ۱۴ و ۱۳ مطالعه را شناسایی کردند که به خوبی شرایط کنترل شده را ایجاد کرده بودند.

در فراتحلیل حاضر، تعداد کمی از مطالعات بررسی شده شامل یک گروه کنترل فعال / دارونما، مانند یک بازخورد نادرست یا یک گروه بازخورد ساختگی بود. مطالعه رینگ و همکاران (۲۰۱۵) نمونه خوبی از اهمیت گروه کنترل و دارونما است. نتایج آن‌ها نشان داد که هرچند ورزشکاران در گروه مداخله نوروفیدبک یاد گرفتند که قبل از ضربه گلف قدرت آلفا بالای قشر فرونتال خود را کاهش دهند (الگوی شبیه به یک ورزشکار خبره)، با این وجود مداخله نوروفیدبک نتوانست عملکرد انتخابی را افزایش دهد؛ زیرا هر دو گروه کنترل و کنترل دارونما، عملکردی مشابه گروه آزمایش داشتند. بنابراین، برای ارزیابی منظم تأثیرات واقعی مداخلات نوروفیدبک بر عملکرد ورزشی، داشتن گروه کنترل کافی نیست و وجود یک گروه کنترل فعال / دارونما از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این احتمال وجود

1. Niv
2. Lofthouse et al.

به یادگیری و بهبود عملکرد منجر شده است که با تغییرات در سطح الکتروانسفالوگرافی نشان داده می‌شود یا خیر (رستمی و همکاران، ۲۰۱۲). این نکته‌ای کلیدی است؛ زیرا اگر مداخله نوروفیدبک نتواند تغییرات مورد انتظار را در سطح الکتروانسفالوگرافی ایجاد کند، بنابراین اندازه اثر آموزش به احتمال زیاد به عوامل دیگر نسبت داده می‌شود. بنابراین، پژوهش‌های آینده نه تنها باید تغییر در عملکرد ورزشی را در نظر بگیرند، بلکه باید تغییر ویژه در قدرت الکتروانسفالوگرافی را نیز مشخص کنند.

محدودیت سوم، مربوط به پروتکل‌های استفاده‌شده به‌عنوان مداخله نوروفیدبک است که بسیار متنوع و گوناگون هستند و در مطالعات نیز بسیار متفاوت استفاده شده‌اند. به‌عنوان مثال، مطالعات باند فرکانس مختلف (به‌عنوان مثال، ریتم حسی حرکتی، α و θ) و مناطق مختلف مغزی (به‌عنوان مثال، Pz ، Fz ، Cz ، $C3$ ، $C4$ ، $T3$ و $T4$) را برای اندازه‌گیری اثرات مداخلات نوروفیدبک انتخاب کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که انتخاب فرکانس و مناطق تحریک مغزی، دو جنبه اصلی پروتکل نوروفیدبک هستند (میریفر و همکاران، ۲۰۱۷). منطق مورد استفاده برای انتخاب پروتکل‌ها و مناطق الکتروود گذاری باید از نظر تئوری و تجربی به ارتباط بین باند فرکانس ویژه الکتروانسفالوگرافی و یک رفتار خاص پیوند داشته باشد. مطالعه توسط رینگ و همکاران (۲۰۱۵) نمونه خوبی از منطق انتخاب پروتکل‌های مداخلات نوروفیدبک است (رینگ و همکاران، ۲۰۱۵). آن‌ها نوروفیدبک را در گلف بازان مورد بررسی قرار دادند تا فعالیت مغز را نسبت به کاهش قدرت آلفای بالای آن‌ها در مناطق پیشانی (Fz) به‌عنوان یک پیش شرط قبل از عملکرد موفقیت‌آمیز تنظیم کنند. در این پژوهش قدرت آلفا بر اساس یافته‌های قبلی انتخاب شد که مهارت و عملکرد مطلوب اجرای ضربه گلف را با مهار الکتروانسفالوگرافی با قدرت آلفا بالا مشخص می‌نمود (کوک و همکاران، ۲۰۱۴). انتخاب Fz بسیار هوشمندانه بود، زیرا مشخص شد که این نقطه بیشترین اختلاف را در قدرت آلفای بالا بین ورزشکاران خبره و

الکتروانسفالوگرافی در ورزشکاران شده و به‌طور مؤثر عملکرد ورزشی را بهبود بخشد. با این حال، اثر مداخله نوروفیدبک برای عملکرد ورزشی با طراحی و به‌کارگیری گروه کنترل تعدیل می‌شود، یعنی هنگامی که تجزیه و تحلیل به کنترل‌های فعال و دارونما محدود شود، ممکن است اثر مداخله نوروفیدبک در عملکرد ورزشی کاهش یابد. پژوهش‌های آینده باید بر تکرار و گسترش اندازه اثر مداخله نوروفیدبک با اندازه‌های نمونه بزرگ‌تر، اتخاذ یک طراحی کاملاً کنترل‌شده از یک گروه فعال / دارونما، ارائه شواهدی برای تغییرات در باندهای فرکانسی آموزش‌دیده، شناسایی مناسب‌ترین پروتکل مداخله‌ای نوروفیدبک بر اساس ارتباط مستقیم نتایج در عملکرد ورزشی و ادغام مداخله نوروفیدبک در فعالیت‌های واقعی و در موقعیت‌های رقابتی در زمین‌های ورزشی توجه کنند.

اعتبار یک مرور نظام‌دار و فرا تحلیل، توسط روش‌های مطالعات موجود محدود می‌شود؛ بنابراین، نتایج این مرور نظام‌دار و فرا تحلیل ممکن است ضعف‌های روش‌های مطالعات را به‌جای نقاط ضعف یاقوت اثر مداخله نوروفیدبک بر عملکرد ورزشکاران منعکس کند. در واقع، مطالعاتی که در مرور نظام‌دار و فرا تحلیل حاضر مورد بررسی قرار گرفت، دارای برخی محدودیت‌های روش‌شناسی^۱ همچون به‌کارگیری گروه کنترل بود.

محدودیت اول پژوهش مربوط به ناهمگنی و تعداد محدود مطالعات است که شامل توانایی تجزیه و تحلیل اندازه اثر مداخله نوروفیدبک در حوزه ورزش است. مطالعاتی که به‌صورت آزمایش‌های تصادفی کنترل‌شده اجرا شده‌اند، بیشتر شامل اندازه نمونه کوچکی بودند که ممکن است در مقایسه با آزمایش‌های با اندازه نمونه بزرگ‌تر، اندازه اثر را بیش‌ازحد نشان دهد؛ بنابراین، پژوهش‌های آینده باید بر تکرار و گسترش اندازه اثر مداخله نوروفیدبک با اندازه نمونه‌های بزرگ‌تر متمرکز باشد.

محدودیت دوم پژوهش مربوط به این است که برخی از مطالعات در نتایج خود گزارش نکردند که آیا مداخله نوروفیدبک در واقع

1. Methodological

تازه‌کار نشان می‌دهد. همچنین مقایسه اجرای موفقیت و ناموفق را در لحظات قبل از ضربات گلف نشان می‌داد (کوک و همکاران، ۲۰۱۴). با این حال، برخی از مطالعات، دلیل واضح و مشخصی برای انتخاب پروتکل‌های خود و محل ثبت الکترودها نداشتند (رستمی و همکاران، ۲۰۱۲). این عوامل ممکن است تأثیر بالقوه‌ای بر نتایج ما داشته باشند؛ بنابراین، منطق انتخاب ویژگی فرکانس و مناطق مغزی باید از نظر تئوری و تجربی بر اساس ارتباط مستقیم عملکرد در اجرای مهارت‌های ورزشی با الگوهای مغزی در پژوهش‌های مداخله نوروفیدبک ارائه شود.

محدودیت چهارم این است که الکترودهای الکتروانسفالوگرافی توسط پوست سر، جمجمه و مایع مغزی نخاعی از منابع فعلی مغز جدا می‌شوند (جان و همکاران، ۲۰۱۴)؛ در نتیجه، الکتروانسفالوگرافی دارای وضوح زمانی میلی‌ثانیه است اما وضوح مکانی ضعیفی دارد. در پژوهش‌های آینده باید به محدودیت تفکیک مکانی الکتروانسفالوگرافی توجه شود و روش‌هایی برای بهبود وضوح مکانی الکتروانسفالوگرافی، مانند انجام تصویربرداری از منبع، یا ترکیب الکتروانسفالوگرافی و تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی^۱ برای مداخله نوروفیدبک در زمینه‌های ورزشی ایجاد شود (مانو و همکاران، ۲۰۱۷).

این مقاله مستخرج از پروژه پسادکتر با شماره ۹۸۰۱۶۷۹۸ و مورد حمایت مالی "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" می‌باشد. تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش‌های پژوهش حاضر مشارکت داشته‌اند. در اجرای پژوهش آقای دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی به عنوان سرپرست پروژه در نگارش و تکمیل ایده‌ی پژوهش و همچنین آقای دکتر امین امینی به عنوان مجری پروژه و ایده‌پرداز اصلی پژوهش همکاری نمودند. نویسندگان مقاله تشکر و قدردانی خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران ابراز می‌دارند.

1. Functional Magnetic Resonance Imaging (fmri)

منابع

1. Amini, A., Mohammad Zadeh, H., salehi, M. (2016). The effect of neurofeedback (SMR training) on performance and reaction time of individuals who undertake difficult tasks. *Journal of Development and Motor Learning*, 8(3), 467-483. (In Persian).
2. Amini, A., Salehi, M., & Mohammadzadeh, H. (2015). A Comparison of the Effects of Neurofeedback and Physical Practices on Performance and Retention of Dart Throw Skill. *Journal of Neuropsychology*, 1(1), 86-103. (In Persian).
3. Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteker, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: the effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: a meta-analysis. *Clin EEGNeurosci*, 40(3), 180-189. doi: 10.1177/155005940904000311
4. Bertollo, M., di Fronso, S., Filho, E., Conforto, S., Schmid, M., Bortoli, L., . . . Robazza, C. (2016). Proficient brain for optimal performance: the MAP model perspective. *PeerJ*, 4, e2082. doi: 10.7717/peerj.2082
5. Birbaumer, N., Elbert, T., Canavan, A. G., & Rockstroh, B. (1990). Slow potentials of the cerebral cortex and behavior. *Physiol Rev*, 70(1), 1-41. doi: 10.1152/physrev.1990.70.1.1

6. Brad, D. H., Daniel, M. L., & William, J. R. (1984). Cognitive Processes During Self-Paced Motor Performance: An Electroencephalographic Profile of Skilled Marksmen. *Journal of Sport Psychology*, 6(1), 42-59. doi: 10.1123/jsp.6.1.42
7. Bradley D. Hatfield, Scott E. Kerick. (2007). The psychology of superior sport performance: A cognitive and affective neuroscience perspective *Handbook of sport psychology, 3rd ed.* (pp. 84-109). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons, Inc.
8. Cheng, M.-Y., Huang, C.-J., Chang, Y.-K., Koester, D., Schack, T., & Hung, T.-M. (2015). Sensorimotor Rhythm Neurofeedback Enhances Golf Putting Performance. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 37, 626 – 636. doi: 10.1123/jsep.2015-0166
9. Cheng, M.-Y., Wang, K.-P., Hung, C.-L., Tu, Y.-L., Huang, C.-J., Koester, D., . . . Hung, T.-M. (2017). Higher power of sensorimotor rhythm is associated with better performance in skilled air-pistol shooters. *Psychology of Sport and Exercise*, 32, 47-53. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.05.007>
10. Cheng, M. Y., Hung, C. L., Huang, C. J., Chang, Y. K., Lo, L. C., Shen, C., & Hung, T. M. (2015). Expert-novice differences in SMR activity during dart throwing. *Biol Psychol*, 110, 212-218. doi: 10.1016/j.biopsycho.2015.08.003
11. Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (H. N. L. E. Associates Ed. 2nd edition ed.): Routledge.
12. Cooke, A., Kavussanu, M., Gallicchio, G., Willoughby, A., McIntyre, D., & Ring, C. (2014). Preparation for action: psychophysiological activity preceding a motor skill as a function of expertise, performance outcome, and psychological pressure. *Psychophysiology*, 51(4), 374-384. doi: 10.1111/psyp.12182
13. Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Holtmann, M., Aggensteiner, P., Daley, D., . . . Sonuga-Barke, E. J. (2016). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 55(6), 444-455. doi: 10.1016/j.jaac.2016.03.007
14. Christie, S., Bertollo, M., & Werthner, P. (2020). The Effect of an Integrated Neurofeedback and Biofeedback Training Intervention on Ice Hockey Shooting Performance, *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 42(1), 34-47. Retrieved Jul 29, 2021, from <https://journals.humankinetics.com/view/journals/jsep/42/1/article-p34.xml>.

15. Crivelli, D., Fronda, G., & Balconi, M. (2019). Neurocognitive Enhancement Effects of Combined Mindfulness-Neurofeedback Training in Sport. *Neuroscience*, 412, 83-93. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.05.066
16. Dekker, M., Berg, B., Denissen, A., Sitskoorn, M., & Van Boxtel, G. (2014). Feasibility of eyes open alpha power training for mental enhancement in elite gymnasts. *Journal of sports sciences*, 32, 1-11. doi: 10.1080/02640414.2014.906044
17. Fallah, M., Moghadas Tabrizi, Y., & gharayagh Zandi, H. (2018). The Effects of Neurofeedback training on Attention and performance in free throw skill. *Journal of Neuropsychology*, 4(13), 97-108.
18. Faridnia, M., Shojaei, M., & Rahimi, A. (2012). The effect of neurofeedback training on the anxiety of elite female swimmers. *Annals of Biological Research*, 3, 1020-1028.
19. Farokhi, A., Hashemian, P., Mirifar, A., Keyhani, M., & Kaikhavani, S. (2013). The effect of neurofeedback training on the trait-competitive anxiety of athletes. *Ilam University of Medical Science*, 21(2), 21-27.
20. Gallicchio, G., Cooke, A., & Ring, C. (2017). Practice Makes Efficient: Cortical Alpha Oscillations Are Associated With Improved Golf Putting Performance. *Sport, exercise, and performance psychology*, 6(1), 89-102. doi: 10.1037/spy0000077.
21. Qazi Tabatabai M, Abu Ali V. Meta-analysis in social and behavioral research. Tehran: Office of Social and Cultural Studies of Tehran Municipality.; 2012. (In Persian).
22. Gong, A., Nan, W., Yin, E., Jiang, C., & Fu, Y. (2020). Efficacy, Trainability, and Neuroplasticity of SMR vs. Alpha Rhythm Shooting Performance Neurofeedback Training. *Front Hum Neurosci*, 14, 94-94.
23. Graczyk, M., Pačalska, M., Ziółkowski, A., Mańko, G., Łukaszewska, B., Kochanowicz, K., Kropotov, I. D. (2014). Neurofeedback training for peak performance. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 21(4), 871-875. doi: 10.5604/12321966.1129950
24. Gruzelier, J. (2013). EEG -neurofeedback for optimising performance. II: Creativity, the performing arts and ecological validity. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 44. doi: 10.1016/j.neubiorev.2013.11.004
25. Gruzelier, J. H. (2014). EEG-neurofeedback for optimising performance. I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 124-141. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.09.015>

26. Hashemian, P., Farrokhi A, Mirifar A, Keihani K, Sadjadi A. The effect of neurofeedback training on attention rate in proficient track and field athletics. *Journal of Fundamentals of Mental Health*. 2014;15(60):312-8. (In Persian).
27. Hassan Gharayagh, Z., & Seyed Mohammad, Z. (2020). The effects of neurofeedback and mindfulness on visual continuous performance of young football players. *Development & Motor Learning*, 12(40), 133-151. (In Persian).
28. Hatfield, B. D., Haufler, A. J., Hung, T. M., & Spalding, T. W. (2004). Electroencephalographic studies of skilled psychomotor performance. *J Clin Neurophysiol*, 21(3), 144-156. doi: 10.1097/00004691-200405000-00003
29. Hooman, H.A, Ganji, K., & Omidifar, A. (2013). The Meta-Analysis of the Effectiveness of Life Skills Training on Mental Health. *Developmental Psychology*, 10(37), 39.
30. Haufler, A. J., Spalding, T. W., Santa Maria, D. L., & Hatfield, B. D. (2000). Neuro-cognitive activity during a self-paced visuospatial task: comparative EEGprofiles in marksmen and novice shooters. *Biol Psychol*, 53(2-3), 131-160. doi: 10.1016/s0301-0511(00)00047-8
31. Hung, T. M., Haufler, A. J., Lo, L. C., Mayer-Kress, G., & Hatfield, B. D. (2008). Visuomotor expertise and dimensional complexity of cerebral cortical activity. *Med Sci Sports Exerc*, 40(4), 752-759. doi: 10.1249/MSS.0b013e318162c49d
32. Jain, S., Sharma, S., & Jain, K. (2019). Meta-Analysis of Fixed, Random and Mixed Effects Models. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences*, 4, 199-218. doi: 10.33889/IJMEMS.2019.4.1-018
33. Jeunet, C., Tonin, L., Albert, L., Chavarriaga, R., Bideau, B., Argelaguet, F., . . . Kulpa, R. (2020). Uncovering EEGCorrelates of Covert Attention in Soccer Goalkeepers: Towards Innovative Sport Training Procedures. *Scientific Reports*, 10(1), 1705. doi: 10.1038/s41598-020-58533-2
34. Kao, S.-C., Huang, C.-J., & Hung, T.-M. (2014). Neurofeedback Training Reduces Frontal Midline Theta and Improves Putting Performance in Expert Golfers. *Journal of Applied Sport Psychology*, 26, 271-286. doi: 10.1080/10413200.2013.855682
35. Keele, S. W. (1968). Movement control in skilled motor performance. *Psychological Bulletin*, 70(6, Pt.1), 387-403. doi: 10.1037/h0026739

36. Kermani, Z., Mohammadyfar, M., Talepasand, S. & Najafi, M., (2020). Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students'. *Quarterly Journal of Psychological Studies*, 15(4), 125-140.
37. Klimesch, W. (1997). EEG-alpha rhythms and memory processes. *Int J Psychophysiol*, 26(1-3), 319-340. doi: 10.1016/s0167-8760(97)00773-3
38. Kober, S. E., Witte, M., Stangl, M., Våljamäe, A., Neuper, C., & Wood, G. (2015). Shutting down sensorimotor interference unblocks the networks for stimulus processing: An SMR neurofeedback training study. *Clinical Neurophysiology*, 126(1), 82-95. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.03.031>
39. Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology*, 4(863). doi: 10.3389/fpsyg.2013.00863
40. Landers, D. M., Petruzzello, S. J., Salazar, W., Crews, D. J., Kubitz, K. A., Gannon, T. L., & Han, M. (1991). The influence of electrocortical biofeedback on performance in pre-elite archers. *Med Sci Sports Exerc*, 23(1), 123-129.
41. Lofthouse, N., Arnold, L. E., Hersch, S., Hurt, E., & DeBeus, R. (2012). A review of neurofeedback treatment for pediatric ADHD. *J Atten Disord*, 16(5), 351-372. doi: 10.1177/1087054711427530
42. Maszczyk, A., Dobrakowski, P., Nitychoruk, M., Żak, M., Kowalczyk, M., & Toborek, M. (2020). The Effect of Neurofeedback Training on the Visual Processing Efficiency in Judo Athletes. *Journal of Human Kinetics*, 71, 219-227. doi: 10.2478/hukin-2019-0097
43. Maszczyk, A., Gołaś, A., Pietraszewski, P., Kowalczyk, M., Cieszczyk, P., Kochanowicz, A., . . . Zajac, A. (2018). Neurofeedback for the enhancement of dynamic balance of judokas. *Biology of Sport*, 35. doi: 10.5114/biolport.2018.71488
44. Micoulaud-Franchi, J. A., Geoffroy, P. A., Fond, G., Lopez, R., Bioulac, S., & Philip, P. (2014). EEGneurofeedback treatments in children with ADHD: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Hum Neurosci*, 8, 906. doi: 10.3389/fnhum.2014.00906
45. Mikicin, M. (2015). The autotelic involvement of attention induced by EEGneurofeedback training improves the performance of an athlete's mind. *Biomedical Human Kinetics*, 7. doi: 10.1515/bhk-2015-0010

46. Mikicin, M., Orzechowski, G., Jurewicz, K., Paluch, K., Kowalczyk, M., & Wróbel, A. (2015). Brain-training for physical performance: a study of EEG - neurofeedback and alpha relaxation training in athletes. *Acta Neurobiol Exp (Wars)*, 75(4), 434-445.
47. Mirifar, A., Beckmann, J., & Ehrlenspiel, F. (2017). Neurofeedback as supplementary training for optimizing athletes' performance: A systematic review with implications for future research. *Neurosci Biobehav Rev*, 75, 419-432. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.02.005
48. Mohammadyfar, M., & Kermani, Z. (2018). The Effectiveness of Neurofeedback Training in Improving Executive Functional Attention and Cognitive Flexibility of Athlete Students. *Journal of Neuropsychology*, 3(11), 71-90.
49. Movahedi, Y. (2018). Effectiveness of EEGbiofeedback on creativity and pattern of brain waves. *Nurse and Physician Within War*, 6(20), 36-42.
50. Nabavi Aleagha A, Naderi F, Heidarei A, Nazari M, Nicksirat A, Avakh F. The effect of neurofeedback (SMR training) on performance and reaction time of individuals who undertake difficult tasks. *EBNESINA*. 2014;15(4):36-41.
51. Namdar, S., Mirifar, A., & Memar, Moghadam, M. (2017). Effects of Neurofeedback Training on Balance and Reaction Time of Track and Field Athletes. *Sport Psychology Studies*, 6(19), 19-30.
52. Narimani, M., Rajabi, S., & Delavar, S. (2013). Effects of Neurofeedback Training on Female Students with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. *J Arak Uni Med Sci*, 16(2), 91-103.
53. Niv, S. (2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. *Personality and Individual Differences*, 54(6), 676-686. doi: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.11.037>
54. Norozi, E., Hosseyni, F.S., & Vaez musavi, V. (2018). The effect of Neurofeedback training on sport performance enhancement and conscious motor processing in skilled dart player. *Development & Motor Learning*, 10(31), 139-157.
55. Oftadehal, M., Movahedi, Y., & Sepahvand, R. (2017). The Effectiveness of Neurofeedback Training on Improving Reaction time Performance in Football Athletes. *Community Health Journal*, 11(2), 1-9.
56. Orndorff-Plunkett, F., Singh, F., Aragón, O. R., & Pineda, J. A. (2017). Assessing the Effectiveness of Neurofeedback Training in the Context of Clinical and Social Neuroscience. *Brain sciences*, 7(8). doi: 10.3390/brainsci7080095
57. Paul, M., Ganesan, S., & Sandhu, J. S. (2011). Effect of sensory motor rhythm neurofeedback on psycho-physiological, electro-encephalographic measures and performance of archery players. *Ibnosina J. Med. Biomed. Sci*, 4, 32-39. doi: 10.4103/1947-489X.210753

58. Raymond, J., Sajid, I., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). Biofeedback and dance performance: a preliminary investigation. *Appl Psychophysiol Biofeedback*, 30(1), 64-73. doi: 10.1007/s10484-005-2175-x
59. Rijken, N. H. M., Soer, R., Maar, E., Prins, H., Teeuw, W., Peuscher, J., & Oosterveld, F. (2016). Increasing Performance of Professional Soccer Players and Elite Track and Field Athletes with Peak Performance Training and Biofeedback: A Pilot Study. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 41. doi: 10.1007/s10484-016-9344-y
60. Ring, C., Cooke, A., Kavussanu, M., McIntyre, D., & Masters, R. (2015). Investigating the efficacy of neurofeedback training for expediting expertise and excellence in sport. *Psychology of Sport and Exercise*, 16, 118-127. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.08.005>
61. Rogala, J., Jurewicz, K., Paluch, K., Kublik, E., Cetnarski, R., & Wróbel, A. (2016). The Do's and Don'ts of Neurofeedback Training: A Review of the Controlled Studies Using Healthy Adults. *Front Hum Neurosci*, 10, 301. doi: 10.3389/fnhum.2016.00301
62. Rostami, R., Sadeghi, H., Karami, K. A., Abadi, M. N., & Salamati, P. (2012). The Effects of Neurofeedback on the Improvement of Rifle Shooters' Performance. *Journal of Neurotherapy*, 16(4), 264-269. doi: 10.1080/10874208.2012.730388
63. Salazar, W., Landers, D. M., Petruzzello, S. J., Han, M., Crews, D. J., & Kubitz, K. A. (1990). Hemispheric asymmetry, cardiac response, and performance in elite archers. *Res Q Exerc Sport*, 61(4), 351-359. doi: 10.1080/02701367.1990.10607499
64. Salehi, M., Mohammadzadeh, H., Nazari, M.A. (2013). Effect of neurofeedback training on performance and retention of dart throwing skill. *Journal of Sports Psychology*, 5(1), 739-748.
65. Sherlin, L., Ford, N., & Sherlin, R. (2012). Developing a Performance Brain Training™ Approach for Baseball: A Process Analysis with Descriptive Data. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 38. doi: 10.1007/s10484-012-9205-2
66. Siadatian, S. H., Ghamarani, A., & Yaghobian, F. (2013). The Meta-Analysis of the Effectiveness of Psychological Interventions on the Iranians' Feeling of Happiness. *Transformational Psychology: Iranian Psychologists*, 10(37), 61-69.

67. Sidhu, A., & Cooke, A. (2020). Electroencephalographic neurofeedback training can decrease conscious motor control and increase single and dual-task psychomotor performance. *Exp Brain Res.* doi: 10.1007/s00221-020-05935-3
68. Schmidt, F., & Hunter, J. (2015). Methods of meta-analysis (Third Edition ed.). SAGE Publications, Ltd <https://www.doi.org/10.4135/9781483398105>
69. Sonuga-Barke, E., Brandeis, D., Holtmann, M., & Cortese, S. (2014). Computer-based Cognitive Training for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder A Review of Current Evidence Introduction Target of Treatment: Distinguishing Clinical and Neuropsychological Elements. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America.*
70. Serman, M. B. (1996). Physiological origins and functional correlates of EEG rhythmic activities: implications for self-regulation. *Biofeedback Self Regul,* 21(1), 3-33. doi: 10.1007/bf02214147
71. Strizhkova, O., Cherapkina, L., & Strizhkova, T. (2012). Neurofeedback course applying of high skilled gymnasts in competitive period. *Journal of Human Sport and Exercise,* 7. doi: 10.4100/jhse.2012.7.Proc1.21
72. Wang, Z., Zhou, Y., Chen, L., Gu, B., Liu, S., Xu, M., . . . Ming, D. (2019). A BCI based visual-haptic neurofeedback training improves cortical activations and classification performance during motor imagery. *Journal of Neural Engineering,* 16(6), 066012. doi: 10.1088/1741-2552/ab377d
73. Wolf, F. M. (1986). *Meta-Analysis.* Retrieved from <https://methods.sagepub.com/book/meta-analysis> doi:10.4135/9781412984980
74. Xiang M-Q, Hou X-H, Liao B-G, Liao J-W, Hu M. The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: A meta-analysis. *Psychology of Sport and Exercise.* 2018;36:114-22.
75. Yamashita, A., Hayasaka, S., Kawato, M., & Imamizu, H. (2017). Connectivity Neurofeedback Training Can Differentially Change Functional Connectivity and Cognitive Performance. *Cereb Cortex,* 27(10), 4960-4970. doi: 10.1093/cercor/bhx177
76. Zadkhosh, S.M., Gharayagh, H.Z., & Hemayattalab, R. (2017). The effects of Neurofeedback on Anxiety decrease and Athletic performance Enhancement. *Journal of Applied Psychology Research,* 7(4), 21-37.
77. Zarei, A.A., & Aghaei, H. (2016). A Comparison of the Effectiveness of the Dictates of Hypnosis and Cognitive Rehabilitation Training on Improving the Status of Throwing Basketball Ball. *Journal of Neuropsychology,* 1(3), 80-96.

78. Ziabakhsh S M, Sharifi M, Fath Abadi J, Nejati V. (2020). The effect of neurofeedback on reduction symptoms of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: a meta-analysis study. *shenakht Journal of Psychology and Psychiatry*, 7(2), 64-78.
79. Taghizadeh, F., hosseini ghatreh, F., aghdasi, M. (2019). Effect of SMR Neurofeedback Training on Performance of Table Tennis Players. *Sport Psychology Studies* (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi), 8(27), 55-66. doi: 10.22089/spsyj.2017.4521.1475

نسخه پیش از انتشار